

Brug af lægemidler til behandling og forebyggelse af covid-19

National klinisk anbefaling



Kontaktperson

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67

Sponsorer / Finansiering

Sundhedsstyrelsen

Ansvarsfraskrivelse

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske anbefalinger bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske anbefalinger offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i anbefalingerne.

Nationale kliniske anbefalinger klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. De nationale kliniske anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-452-0

Centrale budskaber

1. Læsevejledning

2. Indledning

3. Definition af sværhedsgrad af sygdom

4. Systemisk glukokortikoid

4.1 Systemisk glukokortikoid til voksne

4.1.1 Systemisk glukokortikoid til voksne med behov for ilt

 Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til voksne med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Remark:

Anbefalingen gælder personer fra 16 år og opefter.

Det anbefales at anvende dexamethason 6 mg dagligt i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid. Behandlingen kan gives per oralt (PO) eller intravenøst (IV).

Hvis dexamethason ikke er tilgængeligt, kan følgende alternative systemiske glukokortikoider anvendes:

- Hydrocortison 80 mg x 2 IV i op til 10 dage
- Prednisolon 40 mg x 1 PO i op til 10 dage
- Methylprednisolon 32 mg x 1 IV/PO i op til 10 dage

4.1.2 Systemisk glukokortikoid til voksne uden behov for ilt

 Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til voksne med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Remark:

Anbefalingen gælder personer fra 16 år og opefter.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til patienter med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt og anafylaktisk shock.

4.2 Systemisk glukokortikoid til gravide

4.2.1 Systemisk glukokortikoid til gravide med behov for ilt

Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til gravide med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Remark:

Det anbefales at anvende prednisolon 40 mg x 1 per oralt (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 intravenøst (IV) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid.

Dexamethason inaktiveres ikke i samme grad som prednisolon og hydrocortison i placenta, hvorfor dexamethason ikke er førstevælg til gravide.

Mange tusinde gravide har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden, at der er fundet overbevisende dokumentation for påvirkning af fosteret ved kortidsanvendelse.

Hvis behandling med systemisk glukokortikoid er indiceret med henblik på føetal lungemodning hos gravide i risiko for preterm fødsel, anbefales det at anvende standard antenatal systemisk glukokortikoid (dexamathason 6 mg x 2 intramuskulært (IM) i 2 dage i henhold til DSOGs vejledning for antenatal behandling med corticosteroid) efterfulgt af prednisolon 40 mg x 1 (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 (IV) op til 10 dages behandling med systemisk glukokortikoid.

4.2.2 Systemisk glukokortikoid til gravide uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til gravide med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Remark:

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til gravide med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt, anafylaktisk shock eller føetal lungemodning ved risiko for preterm fødsel.

4.3 Systemisk glukokortikoid til ammende

4.3.1 Systemisk glukokortikoid til ammende med behov for ilt

Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til ammende med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Remark:

Det anbefales at anvende prednisolon 40 mg x 1 per oralt (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 intravenøst (IV) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid.

Flere ammende har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden, at der er fundet overbevisende dokumentation for skadelig påvirkning af spædbarnet ved kortidsanvendelse.

4.3.2 Systemisk glukokortikoid til ammende uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til ammende med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Remark:

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til ammende med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt, og anafylaktisk shock.

4.4 Systemisk glukokortikoid til børn og unge

4.4.1 Systemisk glukokortikoid til børn og unge med behov for ilt

Svag anbefaling

Overvej at anvende systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom)

Remark:

Anbefalingen gælder børn og unge under 16 år.

Det anbefales at anvende dexamethason 0.15 mg/kg/dag (max 6 mg/dag) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid. Behandlingen kan gives per oralt (PO) eller intravenøst (IV).

Hvis dexamethason ikke er tilgængeligt, kan følgende alternative systemiske glukokortikoider anvendes:

- Hydrocortison 1 mg/kg x 4 IV (max 50 mg x 4) i op til 10 dage
- Prednisolon 1 mg/kg x 1 PO (max 50 mg) i op til 10 dage
- Methylprednisolon 0.8 mg/kg x 1 IV/PO (max 40 mg) i op til 10 dage

4.4.2 Systemisk glukokortikoid til børn og unge uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Remark:

Anbefalingen gælder børn og unge under 16 år.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til børn og unge med covid-19, fx autoimmune sygdomme, astmatisk bronkitis, alvorlige infektionssygdomme inklusiv meningitis, svært lungesvigt, og anafylaktisk shock.

6. Implementering

7. Monitorering

8. Opdatering og videre forskning

9. Beskrivelse af anvendt metode

10. Fokuserede spørgsmål

11. Arbejds- og referencegruppe

12. Begreber og forkortelser

1. Læsevejledning

Læsevejledning

Anbefalingerne er udarbejdet efter GRADE-metoden (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). GRADE er et, internationalt brugt, systematisk og transparent system til at vurdere tiltroen til evidens og udarbejde kliniske anbefalinger.

Anbefalingstyper

Anbefalingen har en retning og en styrke. Anbefalingen er i udgangspunktet for eller imod en given intervention eller diagnostisk test. Styrken af anbefalingen kan være stærk eller svag. Vurdering af anbefalingens retning og styrke giver på den måde mulighed for fire typer af anbefalinger: stærk for, svag for, svag imod eller stærk imod. Retning og styrke afhænger i udgangspunktet af balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger, patientværdier og præferencer samt tiltroen til evidensen. Tiltroen til evidensen afhænger af tiltro til de estimerede effekter for de kritiske udfald.

Stærk anbefaling

Der gives en stærk anbefaling for, når der er stor tiltro til, at de samlede fordele ved interventionen er klart større end ulemerne i forhold til alternativet.

Følgende vil trække i retning af en stærk anbefaling for:

- Høj eller moderat tiltro til evidensen.
- Stor tiltro til, at interventionen gavner og/eller har færre skadevirkninger.
- Patientpræferencer er velkendte og ensartede til fordel for interventionen.

Implikationer:

Langt de fleste patienter vil ønske interventionen frem for alternativet og kun få vil afstå.

Langt de fleste klinikere vil tilbyde interventionen frem for alternativet.

Svag anbefaling

Der gives en svag anbefaling for interventionen frem for alternativet, når det vurderes, at fordelene er større end ulemerne, men forskellen er lille og/eller tiltroen til evidensen er lav eller meget lav. Denne anbefaling anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer.

Følgende vil trække i retning af en svag anbefaling for:

Lav eller meget lav tiltro til evidensen.

Balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger ikke er entydig.

Patientpræferencer er ukendte eller vurderes at variere væsentligt.

Implikationer:

De fleste patienter vil ønske interventionen, men en del vil afstå.

Klinikeren vil skulle hjælpe patienten med at træffe en beslutning, der passer til patientens værdier og præferencer.

Svag anbefaling mod

Der gives en svag anbefaling imod interventionen frem for alternativet, når det vurderes, at ulemperne er større end fordelene, men forskellen er lille og/eller tiltroen til evidensen er lav eller meget lav. Denne anbefaling anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer.

Følgende vil trække i retning af en svag anbefaling imod:

Lav eller meget lav tiltro til evidensen.

Balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger ikke er entydig.

Skadevirkningerne vurderes at være større end den gavnlige effekt.

Patientpræferencer er ukendte eller vurderes at variere væsentlig.

Implikationer:

De fleste patienter vil afstå fra interventionen, men en del vil ønske den.

Klinikeren vil skulle hjælpe patienten med at træffe en beslutning, der passer til patientens værdier og præferencer.

Stærk anbefaling mod

Der gives en stærk anbefaling imod, når der er stor tiltro til, at de samlede ulemper ved interventionen er klart større end fordelene i forhold til alternativet.

Følgende vil trække i retning af en stærk anbefaling imod:

Høj eller moderat tiltro til evidensen

Stor tiltro til, at interventionen ikke gavner, eller at den gavnlige effekt er lille

Stor tiltro til, at interventionen har betydelige skadevirkninger

Patientpræferencer er velkendte og ensartede imod interventionen.

Implikationer:

De fleste patienter vil afstå fra interventionen og kun få vil ønske den

Klinikeren vil meget sjældent tilbyde interventionen frem for alternativet.

Grundlaget for anbefalingen

Grundlaget for anbefalingen er præsenteret i forskningsdokumentationen, nøgleinformation og rationale for anbefalingen.

Forskningsdokumentation

I forskningsdokumentationen præsenteres en sammenfatning af den tilgrundliggende evidens. Ligeledes præsenteres en evidensprofil med de samlede effektestimater, tiltroen til estimaterne samt referencer til studierne.

Tiltroen til estimaterne inddeltes i fire niveauer:

Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt

Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes

Lav: Vi har begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den

estimerede effekt

Meget lav: Vi har meget ringe tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt

Nøgleinformationer

Her gives en fyldestgørende beskrivelse af balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger, den overordnede tiltro til evidensen, patientværdier og præferencer, ressourcer, lighed i sundhed, accept af intervention samt gennemførlighed.

Rationale

Rationalet beskriver, hvordan de ovenstående elementer blev vægtet i forhold til hinanden og resulterede i den aktuelle anbefalings retning og styrke.

Adaption

Hvis anbefalingen er adapteret fra en anden retningslinje, findes her en beskrivelse af eventuelle ændringer.

Referencer:

En samlet referenceliste for anbefalingen.

Videre læsning

For en hurtig og informativ introduktion til GRADE anbefales følgende artikel G.Goldet, J.Howick. Understanding GRADE: an introduction. Journal of Evidence-Based Medicine 6 (2013) 50-54. Se også: <http://www.gradeworkinggroup.org>.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelsens [metodehåndbog](#) for en overordnet introduktion til metoden bag udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer.

God læselyst.

2. Indledning

Formål

Formålet med de nationale kliniske anbefalinger at understøtte en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

Nationale kliniske anbefalinger indeholder alene konkrete handlingsanvisninger indenfor udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger (dvs. hvad der skal gøres og hvem er det relevant for). De har ikke som primært formål at afklare visitation og organisering af indsatsen (hvem der skal tilbyde indsatsen) eller samfundsøkonomiske konsekvenser (hvad er den afledte effekt på ressourcerne og er disse til stede). Disse typer af problemstillinger kan eksempelvis håndteres i en visitationsretningslinje, et pakkeforløb, et forløbsprogram eller en medicinsk teknologivurdering (MTV).

Formålet med disse nationale kliniske anbefalinger er at understøtte en ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet i forbindelse med brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19.

Alle anbefalinger i disse nationale kliniske anbefalinger er udarbejdet på baggrund af evidensgrundlaget fra en eksisterende australsk retningslinje "Australian guidelines for the critical care of people with COVID-19" udarbejdet af Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce [90]. Den australske retningsline er en levende guideline. Det vil sige, at evidensgrundlaget og anbefalinger i retningslinjen opdateres løbende i takt med, at der kommer ny viden på området. Retningslinjen er udgivet elektronisk i Magicapp.org [90].

Den australske retningslinje er udarbejdet efter GRADE-metoden og har herved brugt den samme metode som Sundhedsstyrelsen anvender ved udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger. Ved adaptionsprocessen har vi valgt at beholde afsnittene ved 'Sammenfatningen af evidensen' på engelsk for at bidrage til vidensdeling internationalt. For yderligere oplysninger om adaptionsprocessen se afsnittet 'Beskrivelse af anvendt metode'. Retningslinjen vil løbende blive opdateret og potentielt udvidet med nye anbefalinger i takt med behov og viden på området.

Covid-19

Covid-19 er en infektionssygdom forårsaget af et coronavirus kaldet severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Siden det blev identificeret i december 2019, har det spredt sig rundt i hele verden i flere bølger. Der er nu identificeret flere varianter af SARS-CoV-2. De nye varianter har drevet bølgerne i epidemien med forskellig udbredning i tid og sted. Det har vist sig, at de forskellige varianter er forbundet med forskellig grad af smitsomhed, sygelighed og dødelighed.

De fleste patienter med SARS-CoV-2 præsenterer sig med milde symptomer uden behov for specialbehandling. Dog vil nogle patienter udvikle moderat, alvorlig eller kritisk sygdom. Ældre patienter og patienter med underliggende sygdomme/tilstande (fx. diabetes, hjertekarsygdomme) har øget risiko for et kompliceret covid-19 forløb.

Afgrænsning af patientgruppe

De nationale kliniske anbefalinger omhandler børn og unge, voksne, og gravide og ammende med covid-19, samt individer med risiko for et kompliceret forløb af covid-19.

Både patienter med mild, moderat, alvorlig og kritisk covid-19 sygdom er dækket af anbefalingerne.

Både forebyggende behandling og målrettet (terapeutisk) behandling er dækket af anbefalingerne.

Målgruppe/brugere

Målgruppen for disse nationale kliniske anbefalinger er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

Patienter og pårørende kan ligeledes have interesse i at orientere sig i anbefalingerne.

Afgrænsning af område

Disse nationale kliniske anbefalinger indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger

('punktnedslag i patientforløbet'). Disse problemstillinger er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen og give vejledning. Som nævnt ovenfor, beskæftiger disse nationale kliniske anbefalinger sig med brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19.

Patientperspektivet

I disse nationale kliniske anbefalinger er patientperspektivet repræsenteret gennem inddragelse af tidligere og aktuelle patienter med covid-19 samt deres pårørende. Der har været nedsat et brugerpanel, der tilsammen udgør en bred repræsentation af patientgruppen for de nationale kliniske anbefalinger. Panelet bestod således af patienter med forskellige sygdomsgrader og risikogrupper, ligesom patienter og pårørende til både voksne, gravide og ammende samt børn og unge var repræsenteret. Brugerpanelet har løbende kommenteret på udkast til anbefalinger og handlingsanvisende støttetekst, og har bidraget med input til afsnittene om patientværdier og præferencer.

3. Definition af sværhedsgrad af sygdom

Definitioner af sværhedsgrad af covid-19 har taget udgangspunkt i definitionerne fra den australske retningslinje [90]. Arbejdsgruppen har tilpasset definitionerne, så de passer til danske forhold.

Voksne og gravide/ammende:

Definitionen gælder for personer fra 16 år.

IKKE iltkrævende		Iltkrævende	
MILD	MODERAT	ALVORLIG	KRITISK
Øvre luftvejsinfektion uden behov for iltbehandling	Nedre luftvejsinfektion uden behov for iltbehandling	Nedre luftvejsinfektion med behov for iltbehandling	Organsvigt med behov for intensiv terapi
<p>Et individ uden symptomer tydende på moderat eller svær sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen eller milde symptomer (feber, hoste, halssmerter, hovedpine, muskelsmerter, kvalme, opkastning, diarre, tab af lugte og smagssans) • Ingen respiratoriske symptomer • Ingen kliniske eller billeddiagnostiske holdepunkter for nedre luftvejsinfektion 	<p>Stabil patient med kliniske eller billeddiagnostiske tegn på nedre luftvejsinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perifer iltmætning på mindst 94% (1) uden ilttilskud i hvile • Fald i iltmætning eller åndenød ved let fysisk aktivitet 	<p>Patient med forværring af moderat sygdom</p> <p>ELLER</p> <p>mindst et af følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respirationsfrekvens > 30/min • Iltmætning < 94% (1) (med eller uden ilttilskud) • Udbredte infiltrater billeddiagnostisk 	<p>Patient som opfylder et eller flere af følgende kriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respiratorisk svigt – med en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Svært respiratorisk svigt/ARDS • Forværring i tilstanden under behandling med non-invasiv ventilation (NIV) eller high-flow nasal iltterapi (HFNO) • Behov for invasiv mekanisk ventilation (respiratorbehandling) 2. Kredsløbssvigt/shock 3. Bevidsthedssvækkelse 4. Andre organsvigt

(1) Saturationsgrænsen kan være anderledes for patienter med kronisk respirationsinsufficiens

Børn og unge:

Definitionen gælder for børn under 16 år.

Klassifikationen bør foregå parallelt med den initiale standardbehandling af det aktuelle sygdomsbillede.

Hvis kriterierne falder på tværs af forskellige sværhedsgrader bruges den mest alvorlige klassificering.

MILD	MODERAT	ALVORLIG	KRITISK
<i>Ikke indlæggelseskrævende</i>	<i>Indlæggelseskrævende</i>	<i>Hypoksi</i>	<i>Behov for Intensiv terapi</i>

Hydrering og bevidsthedsniveau	Normalt/let nedsat væskeindtag OG Normal bevidsthed	Nedsat væskeindtag med behov for væske via sonde eller iv OG Normal bevidsthed	Nedsat væskeindtag med behov for væske via sonde eller iv ELLER Træthed/sløvhed, men vækkes nemt	Ring væskeindtag med behov for væske iv ELLER Nedsat bevidsthedsniveau/ukontaktbar
Respiratorisk status	Ingen/milde øvre luftvejssymptomer	Moderat øget respirationsarbejde ELLER Kort selvlimiterende apnø (spædbørn)	Svært øget respirationsarbejde ELLER Stimulationskrævende apnø (spædbarn)	Respiratorisk svigt med behov for understøttende behandling ELLER Kredsløbssvigt med behov medicinsk behandling ELLER Andet organsvigt
Saturation og iltilskud ⁽¹⁾	Saturation $\geq 95\%$ uden iltilskud	Saturation 90-94% uden iltilskud Saturation $> 94\%$ med iltilskud	Saturation 85-89% uden iltilskud Saturation 90-94% med iltilskud	Behov for avanceret respiratorisk støtte i intensivt regi (højt iltkrav, mekanisk ventilation eller extracorporeal membrane oxygenation (ECMO))

⁽¹⁾Saturationsgrænser kan være anderledes for patienter med medfødt/cyanotisk hjertesygdom

4. Systemisk glukokortikoid

Systemisk glukokortikoid anvendes profylaktisk og terapeutisk indenfor en række både akutte og kroniske sygdomme, og effekten af systemisk glukokortikoid til patienter med covid-19 er blevet undersøgt i en række kliniske forsøg.

Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger for henholdsvis voksne, gravide, ammende samt børn og unge. Alle anbefalinger er baseret på det samme evidensgrundlag, men da tiltroen til evidensen er vurderet forskellig af populationen, er der separate evidensprofiler for henholdsvis voksne, gravide, ammende samt børn og unge. For hver delpopulation gives anbefalinger for henholdsvis patienter med behov for ilt og uden behov for ilt.

4.1 Systemisk glukokortikoid til voksne

4.1.1 Systemisk glukokortikoid til voksne med behov for ilt

Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til voksne med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Anbefalingen gælder personer fra 16 år og op efter.

Det anbefales at anvende dexamethason 6 mg dagligt i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid. Behandlingen kan gives per oral (PO) eller intravenøst (IV).

Hvis dexamethason ikke er tilgængeligt, kan følgende alternative systemiske glukokortikoider anvendes:

- Hydrocortison 80 mg x 2 IV i op til 10 dage
- Prednisolon 40 mg x 1 PO i op til 10 dage
- Methylprednisolon 32 mg x 1 IV/PO i op til 10 dage

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Overvejende fordele ved det anbefalede alternativ

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø hos voksne med covid-19 og deres behov for iltbehandling. Analyserne viser, at der er 51 færre dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyserne viser, at der er 38 færre events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling hos voksne med behov for iltbehandling.

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis ikke antallet af personer med alvorlige hændelser hos voksne med behov for iltbehandling, men øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi.

Kritiske outcomes (voksne med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis behov for 'invasiv respiratorbehandling eller død' (inden for 28 dage)

(moderat tiltro)

Vigtige outcomes (voksne med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser (inden for 28 dage) (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antal patienter der udskrives fra hospital inden for 28 dage (moderat tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for voksne med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Moderat

Kvaliteten af evidensen er samlet set moderat, idet der er moderat tiltro til de to kritiske outcomes.

Det kritiske outcome *død af alle årsager* blev nedgraderet én gang på grund af alvorlig heterogenitet (retning af effekt ikke konsistent).

Det kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* blev nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Ingen betydelig variation forventet

Det forventes, at både patienter og pårørende overvejende vil foretrække interventionen. Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for interventionen.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider er alment tilgængelige og billige.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Behandling med systemisk glukortikoid forventes ikke at føre til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider anvendes i forvejen til mange patientgrupper, hvorfor behandlingen forventes at være acceptabel for både patienter og sundhedspersonale.

Det vurderes ikke, at anvendelse af systemisk glukokortikoid til patienter med iltkrævende (alvorlig/kritisk) covid-19 har betydning for tilgængeligheden af dette lægemiddel til andre patientgrupper.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Der forventes ikke at være udfordringer med tilgængeligheden af systemisk glukokortikoid, og en af de alternative formuleringer (hydrocortison eller prednisolon) kan i givet fald anvendes.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis reducerer dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt. Samtidig forventes patientpræferencer at være ensartede til fordel for interventionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at de gavnlige effekter i forhold til reduceret dødelighed og nedsat behov for invasiv mekanisk ventilation klart overstiger de sandsynlige skadelige virkninger i form af øget antal patienter med hyperglykæmi.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Adults over 16 years with covid-19 who require oxygen

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard care

Sammenfatning

Evidence indicates that corticosteroids reduce deaths in patients with critical or severe COVID-19, but may increase deaths in patients with moderate COVID-19.

What is the evidence informing this recommendation?

Evidence comes from a meta-analysis and associated living guidance [25] of seven randomised trials of patients with critical COVID-19 [8][9][3][23][24][15][16], one study of patients with moderate, severe and critical COVID-19 [20], and one study of patients with severe COVID-19 [10]. Over 5700 patients are included in the meta-analysis. All trials compared corticosteroids plus standard care with standard care alone.

In addition, two meta-analyses of corticosteroids for other conditions—other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia, acute respiratory distress [26] and sepsis [21]—provided indirect evidence for serious adverse events.

Three new studies comparing corticosteroids with standard care were found [6][11][22]. These studies are currently under review and, although not expected to change the recommendation, an updated recommendation will be included in a future version of the guideline.

Study characteristics

Three studies compared dexamethasone with standard care [23][24][20], three compared hydrocortisone with standard care [8][3][16] and three compared methylprednisolone with standard care [9][15][10].

Disease severity was reported independently for each trial. Definitions included patients who required mechanical ventilation or NIV, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, positive end-expiratory pressure (PEEP) $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$, and the presence of pneumonia or infiltrates on chest imaging.

Mean or median age ranged from 57 to 67 years in the corticosteroid groups and from 60 to 66 years in the standard care groups. The proportion of women was 32% (range 13% to 43%) in the corticosteroid groups and 29% (range 21% to 36%) in the standard care groups.

What are the main results?

Compared with standard care, corticosteroids probably reduce death in patients with severe and critical COVID-19. For every 1000 patients given corticosteroids, 51 more are likely to survive compared with those receiving standard care (RR 0.84 CI 95% 0.73 to 0.98; 5789 patients in 9 studies). Corticosteroids in patients requiring oxygen also probably reduce the composite outcome of requirement for invasive mechanical ventilation or death, and time to discharge from hospital.

In patients who do not require oxygen, corticosteroids probably increase death (RR 1.27 CI 95% 1.00 to 1.61; 1535 patients in 1 study) and the composite outcome of invasive mechanical ventilation or death.

Indirect evidence of corticosteroid use in patients with other, similar indications shows no difference in the incidence

of gastrointestinal bleeding, superinfections, neuromuscular weakness and neuropsychiatric effects. However, corticosteroid use was associated with an increase in hyperglycaemia (RR 1.16 CI 95% 1.08 to 1.25; 8938 patients in 8 studies).

Our confidence in the results

In patients with severe or critical illness, certainty of the evidence is moderate for all-cause mortality and serious adverse events (due to serious inconsistency in direction of effect) and invasive mechanical ventilation or death, and discharge from hospital (due to serious imprecision).

In patients with moderate illness, certainty is low for all outcomes (all-cause mortality, invasive mechanical ventilation or death and discharge from hospital) due to very serious imprecision (reliance on a single study and wide confidence intervals).

For adverse events (gastrointestinal bleeding, super infections, hyperglycaemia, neuromuscular weakness and neuropsychiatric effects), certainty is low due to serious indirectness (evidence from non-COVID-19 patients) and serious imprecision.

Additional information

Pregnant and breastfeeding women

A total of 4 pregnant women (from RECOVERY trial [20]) and no breastfeeding women were included in the meta-analysis.

Children and adolescents

Very few (unspecified) children/adolescents (from RECOVERY trial [20]) were included in the meta-analysis.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
All-cause mortality [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.84 (CI 95% 0.73 – 0.98) Baseret på data fra 5,789 patienter i 9 studier. ¹ (Randomiserede studier) 9 Kritisk	316 per 1.000 Forskel:	265 per 1.000 51 færre per 1.000 (CI 95% 85 færre – 6 færre)	Moderat På grund af alvorlig inkonsistente resultater ²	Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos voksne med behov for iltbehandling
Invasive mechanical ventilation or death [adults requiring oxygen] ³ Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.88 (CI 95% 0.79 – 0.97) Baseret på data fra 3,883 patienter i 1 studier. ⁴ (Randomiserede studier) 9 Kritisk	320 per 1.000 Forskel:	282 per 1.000 38 færre per 1.000 (CI 95% 67 færre – 10 færre)	Moderat På grund af alvorlig upracist effektestimat ⁵	Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos voksne med behov for iltbehandling
Serious adverse events [adults]	Relative risiko 0.8 (CI 95% 0.53 – 1.19)	234	187	Moderat På grund af	Systemisk glukokortikoid øger

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Baseret på data fra 696 patienter i 6 studier. ⁶ (Randomiserede studier) 6 Vigtig	per 1.000 Forskel:	per 1.000 47 færre per 1.000 (CI 95% 110 færre – 44 flere)	alvorlig inkonsistente resultater ⁷	sandsynligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser (inden for 28 dage) blandt voksne med behov for iltbehandling i betydlig grad
Discharge from hospital [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.1 (CI 95% 1.06 – 1.15) Baseret på data fra 4,952 patienter i 2 studier. ⁸ (Randomiserede studier) 6 Vigtig	582 per 1.000 Forskel:	640 per 1.000 58 flere per 1.000 (CI 95% 35 flere – 87 flere)	Moderat På grund af alvorlig inkonsistente resultater ⁹	Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt voksne med behov for iltbehandling
All-cause mortality [adults not requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.27 (CI 95% 1 – 1.61) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁰ (Randomiserede studier) 9 Kritisk	140 per 1.000 Forskel:	178 per 1.000 38 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 85 flere)	Moderat På grund af alvorlig upræcis effektestimat ¹¹	Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos voksne uden behov for iltbehandling
Invasive mechanical ventilation or death [adults not requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.25 (CI 95% 1 – 1.57) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹² (Randomiserede studier) 9 Kritisk	155 per 1.000 Forskel:	194 per 1.000 39 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 88 flere)	Moderat På grund af alvorlig upræcis effektestimat ¹³	Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos voksne uden behov for iltbehandling
Discharge from hospital [adults not requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.96 (CI 95% 0.9 – 1.01) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁴ (Randomiserede studier) 6 Vigtig	804 per 1.000 Forskel:	772 per 1.000 32 færre per 1.000 (CI 95% 80 færre – 8 flere)	Moderat På grund af alvorlig upræcis effektestimat ¹⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker sandsynligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt voksne uden behov for iltbehandling i betydlig grad

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Gastrointestinal bleeding End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.06 (CI 95% 0.85 – 1.33) Baseret på data fra 5,403 patienter i 30 studier. ¹⁶	48 per 1.000 Forskel:	51 per 1.000 3 flere per 1.000 (CI 95% 7 færre – 16 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁷	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad
Super infections End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.01 (CI 95% 0.9 – 1.13) Baseret på data fra 6,027 patienter i 32 studier. ¹⁸	186 per 1.000 Forskel:	188 per 1.000 2 flere per 1.000 (CI 95% 19 færre – 24 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁹	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad
Hyperglycaemia End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.16 (CI 95% 1.08 – 1.25) Baseret på data fra 8,938 patienter i 24 studier. ²⁰	286 per 1.000 Forskel:	332 per 1.000 46 flere per 1.000 (CI 95% 23 flere – 72 flere)	Moderat På grund af alvorlig manglende overførbarhed ²¹	Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi
Neuromuscular weakness End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.09 (CI 95% 0.86 – 1.39) Baseret på data fra 6,358 patienter i 8 studier. ²²	69 per 1.000 Forskel:	75 per 1.000 6 flere per 1.000 (CI 95% 10 færre – 27 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²³	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad
Neuropsychiatric effects End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 0.81 (CI 95% 0.41 – 1.63) Baseret på data fra 1,813 patienter i 7 studier. ²⁴	35 per 1.000 Forskel:	28 per 1.000 7 færre per 1.000 (CI 95% 21 færre – 22 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad

1. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: Steroids-SARI 2020, RECOVERY, RECOVERY, REMAP-CAP 2020, CoDEX 2020, Edalatifard 2020, COVID STEROID 2020, METCOVID 2020, DEXA-COVID 19 2020, CAPE COVID 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
2. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
3. The number of patients with severe illness (i.e. who do not require mechanical ventilation at enrolment) that progress to requiring invasive mechanical ventilation or death within 28 days
4. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
5. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.

6. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: COVID STEROID 2020, CoDEX 2020, DEXA-COVID 19 2020, Steroids-SARI 2020, REMAP-CAP 2020, CAPE COVID 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
7. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
8. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY, Edalatifard 2020, RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
9. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The confidence interval of some of the studies do not overlap with those of most included studies/ the point estimate of some of the included studies..
10. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
11. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study, Wide confidence intervals.
12. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
13. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
14. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
15. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
16. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
17. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
18. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
19. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
20. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
21. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.**
22. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
23. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
24. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
25. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.

Referencer

2. Systemic corticosteroids for COVID-19.
3. Angus DC, Derde L, Al-Beidh F, Annane D, Arabi Y, Beane A, et al. : Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
6. Corral-Gudino L, Bahamonde A, Arnaiz-Revillas F, Gómez-Barquero J, Abadía-Otero J, García-Ibarbia C, et al. : Methylprednisolone in adults hospitalized with COVID-19 pneumonia. Wiener klinische Wochenschrift 2021;133(7):303-311 [Journal Link](#)
8. Dequin P-F, Heming N, Meziani F, Plantefève G, Voiriot G, Badié J, et al. : Effect of hydrocortisone on 21-day mortality or respiratory support among critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
9. Du B, Weng LI : Glucocorticoid therapy for COVID-19 critically ill patients with severe acute respiratory failure. ClinicalTrials.gov 2020; [Link](#)
10. Edalatifard M, Akhtari M, Salehi M, Naderi Z, Jamshidi A, Mostafaei S, et al. : Intravenous methylprednisolone pulse as a treatment for hospitalised severe COVID-19 patients: results from a randomised controlled clinical trial. European Respiratory Journal 2020; [Pubmed Journal](#)
11. Jamaati H, Hashemian SM, Farzanegan B, Malekmohammad M, Tabarsi P, Marjani M, et al. : No clinical benefit of high dose corticosteroid administration in patients with COVID-19: A preliminary report of a randomized clinical trial. European journal of pharmacology 2021;897 173947 [Journal Link](#)

15. Jeronimo CMP, Farias MEL, Val FFA, Sampaio VS, Alexandre MAA, Melo GC, et al. : Methylprednisolone as adjunctive therapy for patients hospitalized with COVID-19 (Metcovid): a randomised, double-blind, phase IIb, placebo-controlled trial. *Clinical Infectious Diseases* 2020; [Pubmed Journal](#)
16. Munch MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjaer M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia: the COVID STEROID randomised, placebo-controlled trial. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica* 2021; [Pubmed Journal](#)
17. Petersen MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjær M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia (COVID STEROID) trial: protocol and statistical analysis plan. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica* 2020; [Pubmed Journal](#)
20. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al. : Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. *New England Journal of Medicine* 2021; [Pubmed Journal Link](#)
21. Rochwerg B, Oczkowski SJ, Siemieniuk RAC, Agoritsas T, Belley-Cote E, D'Aragon F, et al. : Corticosteroids in sepsis: an updated systematic review and meta-analysis. *Critical Care Medicine* 2018;46(9):1411-1420 [Pubmed Journal](#)
22. Tang X., Feng Y-M, Ni J-X, Zhang J-Y, Liu L-M, Hu K., et al. : Early Use of Corticosteroid May Prolong SARS-CoV-2 Shedding in Non-Intensive Care Unit Patients with COVID-19 Pneumonia: A Multicenter, Single-Blind, Randomized Control Trial. *Respiration* 2021;100(2):116-126 [Journal Link](#)
23. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, Berwanger O, Rosa RG, Veiga VC, et al. : Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial. *JAMA* 2020; [Pubmed Journal](#)
24. Villar J, Añón JM, Ferrando C, Aguilar G, Muñoz T, Ferreres J, et al. : Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. *Trials* 2020;21(1):717 [Pubmed Journal](#)
25. World Health Organization : Corticosteroids for COVID-19, Living Guidance. 2 September 2020; [Link](#)
26. Ye Z, Wang Y, Colunga-Lozano LE, Prasad M, Tangamornsuksan W, Rochwerg B, et al. : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19 based on evidence for COVID-19, other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. *CMAJ* 2020;192(27):E756-E767 [Pubmed Journal](#)

4.1.2 Systemisk glukokortikoid til voksne uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til voksne med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Anbefalingen gælder personer fra 16 år og opefter.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til patienter med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt og anafylaktisk shock.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Væsentlige ulemper

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø hos voksne med covid-19 uden behov for iltbehandling.

Analyserne viser, at der er 38 flere dødsfald per 1000 indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyserne viser, at der er 39 flere events per 1000 ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling hos voksne uden behov for iltbehandling.

Systemisk glukokortikoid påvirker sandsynligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage hos voksne uden behov for iltbehandling.

Kritiske outcomes (voksne uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis behov for invasiv respiratorbehandling eller død (inden for 28 dage) (moderat tiltro)

Vigtige outcomes (voksne uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker sandsynligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage (moderat tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for voksne med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Moderat

Kvaliteten af evidensen er samlet set moderat, idet der er moderat tiltro til de to kritiske outcomes.

De kritiske outcomes *død af alle årsager* og *invasiv respiratorbehandling eller død* blev nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie og brede konfidensintervaller).

Patientpræferencer

Vi forventer at få patienter vil vælge interventionen

Hvis patienterne informeres grundigt om gavnlige og skadelige virkninger ved behandlingen, forventes der ikke stor variation i patientpræferencer.

Da anbefalingerne for iltkrævende og ikke-iltkrævende patienter går i hver sin retning, kan der være variation i patientpræferencer i en hvis udstrækning. Nogle patienter vil måske foretrække systemisk glukokortikoid, selvom de ikke har behov for ilt, i håbet om at det kan forebygge progression af sygdommen. En forklaring til patient og pårørende af forskellen på forebyggelse af forværring i tilstanden (alvorlig sygdom) versus behandling af kritisk sygdom kan i den sammenhæng være hjælpsom.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ressourceforbrug.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes, at være acceptabelt for både patienter og sundhedspersonale.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes ikke, at udgøre en praktisk udfordring.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis øger dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt. Samtidig forventes patienterne i overvejende grad at ville afstå fra interventionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er usandsynligt, at interventionen har gavnlige virkninger for voksne med covid-19 uden behov for ilt.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Adults over 16 years with covid-19 who do not require oxygen

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard Care

Sammenfatning

See summary for 'Adults with COVID-19 - Corticosteroids vs Standard care'.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tilført til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	------------

Se evidensprofil
for systemisk
glukokortikoid
til voksne med
behov for ilt
under afsnit
4.1.1

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag

4.2 Systemisk glukokortikoid til gravide

4.2.1 Systemisk glukokortikoid til gravide med behov for ilt

Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til gravide med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Det anbefales at anvende prednisolon 40 mg x 1 per oralt (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 intravenøst (IV) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid.

Dexamethason inaktiveres ikke i samme grad som prednisolon og hydrocortison i placenta, hvorfor dexamethason ikke er førstevælg til gravide.

Mange tusinde gravide har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden, at der er fundet overbevisende dokumentation for påvirkning af fosteret ved korttidsanvendelse.

Hvis behandling med systemisk glukokortikoid er indiceret med henblik på føetal lungemodning hos gravide i risiko for preterm fødsel, anbefales det at anvende standard antenatal systemisk glukokortikoid (dexamathason 6 mg x 2 intramuskulært (IM) i 2 dage i henhold til DSOGs vejledning for antenatal behandling med corticosteroid [7]) efterfulgt af prednisolon 40 mg x 1 (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 (IV) op til 10 dages behandling med systemisk glukokortikoid.

Praktiske oplysninger

Hvis behandling med systemisk glukokortikoid er indiceret med henblik på føetal lungemodning hos gravide i risiko for preterm fødsel, anbefales det, at anvende standard antenatal systemisk glukokortikoid (dexamathason 6 mg x 2 intramuskulært (IM) i 2 dage i henhold til DSOGs vejledning for antenatal behandling med corticosteroid [7]) efterfulgt af prednisolon 40 mg x 1 (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 (IV) op til 10 dages behandling med systemisk glukokortikoid.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Overvejende fordele ved det anbefalede alternativ

Der foreligger sparsomme data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til gravide med covid-19.

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø og behovet for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt. Evidensgrundlaget for voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til gravide med covid-19 med behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos gravide med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø hos gravide med covid-19 og behov for iltbehandling.

Analyser viser, at der blandt voksne er 51 færre dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyser viser, at der blandt voksne er 38 færre events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af personer med alvorlige hændelser hos gravide med behov for iltbehandling, men øger sandsynligvis antallet patienter med hyperglykæmi.

Mange tusinde gravide har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden at der er fundet overbevisende dokumentation for påvirkning af fosteret ved korttidsanvendelse [4][12].

Kritiske outcomes (gravide med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis behov for *invasiv respiratorbehandling eller død* (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (gravide med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for gravide med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen for er samlet set lav, idet der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter primært voksne med covid-19, og gravide var kun i meget begrænset omfang inkluderet i forsøgene (4 gravide i alt). Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population.

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorlig heterogenitet (retning af effekt ikke konsistent) og det sammensatte kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* er nedgraderet én på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Ingen betydelig variation forventet

Det forventes, at både patienter og pårørende overvejende vil foretrække interventionen.

Gravide er i risiko for et alvorligt forløb, hvorfor det forventes, at de fleste patienter og pårørende vil foretrække behandlingen.

Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for interventionen grundet overvejende gavnlige effekter. Nogle gravide ville dog kunne have en bekymring i forhold til påvirkning af fosteret ved behandling, selvom der ikke er fundet overbevisende dokumentation for dette [4][12].

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider er alment tilgængelige og billige.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Da systemiske glukokortikoider er alment tilgængelige og billige, forventes behandling med systemisk glukortikoid ikke at føre til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Behandling med systemiske glukokortikoider er alment tilgængelig, billig, og der er stor erfaring med brugen af systemiske glukokortikoider til gravide på andre indikationer, hvorfor behandlingen forventes at være acceptabelt for både patienter og sundhedspersonale.

Det vurderes ikke, at anvendelse af systemisk glukokortikoid til gravide med iltkrævende (alvorlig/kritisk) covid-19 har betydning for tilgængeligheden af dette lægemiddel til andre patientgrupper.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Der forventes ikke at være udfordringer med tilgængeligheden af systemisk glukokortikoid.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis reducerer dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til gravide med covid-19 med behov for ilt. Endvidere tilhører gravide med covid-19 med behov for ilt en patientgruppe med risiko for et alvorligt forløb, hvorfor der var enighed om en stærk anbefaling for systemisk glukokortikoid til denne population til trods for lav tiltro til evidensen grundet extrapolation.

Arbejdsgruppen vurderede, at de gavnlige effekter i forhold til reduceret dødelighed og nedsat behov for invasiv mekanisk ventilation klart overstiger de sandsynlige skadelige virknings i form af øget antal patienter med hyperglykæmi.

Patientpræferencerne forventes at være ensartede til fordel for intervention.

Der er stor erfaring med behandling med systemisk glukortikoid til gravide på andre indikationer, herunder føtal lungemodning, og der er ikke fundet overbevisende dokumentation for påvirkning af fosteret ved korttidsanvendelse.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Pregnant women with covid-19 who require oxygen [adapted from general adult population]

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard care

Sammenfatning

Evidence indicates that corticosteroids reduce deaths in patients with critical or severe COVID-19, but may increase deaths in patients with moderate COVID-19.

What is the evidence informing this recommendation?

Evidence comes from a meta-analysis and associated living guidance [25] of seven randomised trials of patients with critical COVID-19 [8][9][3][23][24][15][16], one study of patients with moderate, severe and critical COVID-19 [20], and one study of patients with severe COVID-19 [10]. Over 5700 patients are included in the meta-analysis. All trials compared corticosteroids plus standard care with standard care alone.

In addition, two meta-analyses of corticosteroids for other conditions—other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia, acute respiratory distress [26] and sepsis [21]—provided indirect evidence for

serious adverse events.

Three new studies comparing corticosteroids with standard care were found [6][11][22]. These studies are currently under review and, although not expected to change the recommendation, an updated recommendation will be included in a future version of the guideline.

Study characteristics

Three studies compared dexamethasone with standard care [23][24][20], three compared hydrocortisone with standard care [8][3][16] and three compared methylprednisolone with standard care [9][15][10].

Disease severity was reported independently for each trial. Definitions included patients who required mechanical ventilation or NIV, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, positive end-expiratory pressure (PEEP) $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$, and the presence of pneumonia or infiltrates on chest imaging.

Mean or median age ranged from 57 to 67 years in the corticosteroid groups and from 60 to 66 years in the standard care groups. The proportion of women was 32% (range 13% to 43%) in the corticosteroid groups and 29% (range 21% to 36%) in the standard care groups.

What are the main results?

Compared with standard care, corticosteroids probably reduce death in patients with severe and critical COVID-19. For every 1000 patients given corticosteroids, 51 more are likely to survive compared with those receiving standard care (RR 0.84 CI 95% 0.73 to 0.98; 5789 patients in 9 studies). Corticosteroids in patients requiring oxygen also probably reduce the composite outcome of requirement for invasive mechanical ventilation or death, and time to discharge from hospital.

In patients who do not require oxygen, corticosteroids probably increase death (RR 1.27 CI 95% 1.00 to 1.61; 1535 patients in 1 study) and the composite outcome of invasive mechanical ventilation or death.

Indirect evidence of corticosteroid use in patients with other, similar indications shows no difference in the incidence of gastrointestinal bleeding, superinfections, neuromuscular weakness and neuropsychiatric effects. However, corticosteroid use was associated with an increase in hyperglycaemia (RR 1.16 CI 95% 1.08 to 1.25; 8938 patients in 8 studies).

Our confidence in the results

Certainty of the evidence for all outcomes is judged to be low for pregnant and breastfeeding women, and children and adolescents due to serious indirectness. This is in addition to concerns in the adult population about inconsistency in direction of effect and serious imprecision.

Additional information

Pregnant and breastfeeding women

A total of 4 pregnant women (from RECOVERY trial [20]) and no breastfeeding women were included in the meta-analysis.

Children and adolescents

Very few (unspecified) children/adolescents (from RECOVERY trial [20]) were included in the meta-analysis.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
All-cause mortality [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing	Relative risiko 0.84 (CI 95% 0.73 – 0.98) Baseret på data fra 5,789 patienter i 9 studier. ¹ (Randomiserede studier)	316 per 1.000 Forskell:	265 per 1.000 51 færre per 1.000	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater. På grund af alvorlig	Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos gravide med behov for

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
treatment			(CI 95% 85 færre – 6 færre)	manglende overførbarhed ²	iltbehandling
9 Kritisk					
Invasive mechanical ventilation or death [adults requiring oxygen] ³ Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 0.88 (CI 95% 0.79 – 0.97) Baseret på data fra 3,883 patienter i 1 studier. ⁴ (Randomiserede studier)	320 per 1.000	282 per 1.000	Forskel: 38 færre per 1.000 (CI 95% 67 færre – 10 færre)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcis effektestimat ⁵
9 Kritisk					Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos gravide med behov
Serious adverse events [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.8 (CI 95% 0.53 – 1.19) Baseret på data fra 696 patienter i 6 studier. ⁶ (Randomiserede studier)	234 per 1.000	187 per 1.000	Forskel: 47 færre per 1.000 (CI 95% 110 færre – 44 flere)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁷
6 Vigtig					Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige bivirkninger (inden for 28 dage) blandt gravide med behov for iltbehandling i betydelig grad
Discharge from hospital [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.1 (CI 95% 1.06 – 1.15) Baseret på data fra 4,952 patienter i 2 studier. ⁸ (Randomiserede studier)	582 per 1.000	640 per 1.000	Forskel: 58 flere per 1.000 (CI 95% 35 flere – 87 flere)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁹
6 Vigtig					Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt gravide med behov for iltbehandling
All-cause mortality [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 1.27 (CI 95% 1 – 1.61) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁰ (Randomiserede studier)	140 per 1.000	178 per 1.000	Forskel: 38 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 85 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcis effektestimat ¹¹
9 Kritisk					Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos gravide uden behov for iltbehandling

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Invasive mechanical ventilation or death [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 1.25 (CI 95% 1 – 1.57) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹² (Randomiserede studier)	155 per 1.000	194 per 1.000	Forskel: 39 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 88 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹³ Systemisk glukokortikoid øger muligvis antal patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos gravide uden behov for
Discharge from hospital [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 0.96 (CI 95% 0.9 – 1.01) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁴ (Randomiserede studier)	804 per 1.000	772 per 1.000	Forskel: 32 færre per 1.000 (CI 95% 80 færre – 8 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁵ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antal patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt gravide uden behov for iltbehandling i betydelig grad
Gastrointestinal bleeding End of treatment	Relative risiko 1.06 (CI 95% 0.85 – 1.33) Baseret på data fra 5,403 patienter i 30 studier. ¹⁶	48 per 1.000	51 per 1.000	Forskel: 3 flere per 1.000 (CI 95% 7 færre – 16 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁷ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antal patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad
Super infections End of treatment	Relative risiko 1.01 (CI 95% 0.9 – 1.13) Baseret på data fra 6,027 patienter i 32 studier. ¹⁸	186 per 1.000	188 per 1.000	Forskel: 2 flere per 1.000 (CI 95% 19 færre – 24 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁹ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antal patienter med superinfektion i betydelig grad
Hyperglycaemia End of treatment	Relative risiko 1.16 (CI 95% 1.08 – 1.25) Baseret på data fra 8,938 patienter i 24 studier. ²⁰	286 per 1.000	332 per 1.000	Forskel: 46 flere per 1.000 (CI 95% 23 flere – 72 flere)	Moderat På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²¹ Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antal patienter med hyperglykæmi
Neuromuscular weakness	Relative risiko 1.09 (CI 95% 0.86 – 1.39) Baseret på data fra	69 per 1.000	75 per 1.000	På grund af alvorlig	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antal

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
End of treatment 6 Vigtig	6,358 patienter i 8 studier. ²²	Forskel:	6 flere per 1.000 (CI 95% 10 færre – 27 flere)	manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²³	patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad
Neuropsychiatri c effects End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 0.81 (CI 95% 0.41 – 1.63) Baseret på data fra 1,813 patienter i 7 studier. ²⁴	35 per 1.000 Forskel:	28 per 1.000 7 færre per 1.000 (CI 95% 21 færre – 22 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antal patienter med neuropsykiatrisk effekt i betydelig grad

1. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY, REMAP-CAP 2020, DEXA-COVID 19 2020, CAPE COVID 2020, RECOVERY, METCOVID 2020, Steroids-SARI 2020, COVID STEROID 2020, CoDEX 2020, Edalatifard 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
2. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
- Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.
3. The number of patients with severe illness (i.e. who do not require mechanical ventilation at enrolment) that progress to requiring invasive mechanical ventilation or death within 28 days
4. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
5. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
6. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: Steroids-SARI 2020, COVID STEROID 2020, CAPE COVID 2020, DEXA-COVID 19 2020, REMAP-CAP 2020, CoDEX 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
7. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
- Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.
8. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: Edalatifard 2020, RECOVERY, RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
9. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
- Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.
10. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
11. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study, Wide confidence intervals.
12. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
13. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
14. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
15. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
16. Systematisk oversigtsartikel [25]. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
17. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
18. Systematisk oversigtsartikel [25]. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.

19. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
20. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
21. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
22. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
23. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
24. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
25. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.

Referencer

2. Systemic corticosteroids for COVID-19.
3. Angus DC, Derde L, Al-Beidh F, Annane D, Arabi Y, Beane A, et al. : Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
8. Dequin P-F, Heming N, Meziani F, Plantefève G, Voiriot G, Badié J, et al. : Effect of hydrocortisone on 21-day mortality or respiratory support among critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
9. Du B, Weng LI : Glucocorticoid therapy for COVID-19 critically ill patients with severe acute respiratory failure. ClinicalTrials.gov 2020; [Link](#)
10. Edalatifard M, Akhtari M, Salehi M, Naderi Z, Jamshidi A, Mostafaei S, et al. : Intravenous methylprednisolone pulse as a treatment for hospitalised severe COVID-19 patients: results from a randomised controlled clinical trial. European Respiratory Journal 2020; [Pubmed Journal](#)
15. Jeronimo CMP, Farias MEL, Val FFA, Sampaio VS, Alexandre MAA, Melo GC, et al. : Methylprednisolone as adjunctive therapy for patients hospitalized with COVID-19 (Metcovid): a randomised, double-blind, phase IIb, placebo-controlled trial. Clinical Infectious Diseases 2020; [Pubmed Journal](#)
16. Munch MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjaer M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia: the COVID STEROID randomised, placebo-controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2021; [Pubmed Journal](#)
20. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al. : Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal](#) [Link](#)
21. Rochwerg B, Oczkowski SJ, Siemieniuk RAC, Agoritsas T, Belley-Cote E, D'Aragon F, et al. : Corticosteroids in sepsis: an updated systematic review and meta-analysis. Critical Care Medicine 2018;46(9):1411-1420 [Pubmed Journal](#)
23. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, Berwanger O, Rosa RG, Veiga VC, et al. : Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
24. Villar J, Añón JM, Ferrando C, Aguilar G, Muñoz T, Ferreres J, et al. : Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. Trials 2020;21(1):717 [Pubmed Journal](#)
25. World Health Organization : Corticosteroids for COVID-19, Living Guidance. 2 September 2020; [Link](#)
26. Ye Z, Wang Y, Colunga-Lozano LE, Prasad M, Tangamornsuksan W, Rochwerg B, et al. : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19 based on evidence for COVID-19, other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2020;192(27):E756-E767 [Pubmed Journal](#)

4.2.2 Systemisk glukokortikoid til gravide uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til gravide med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til gravide med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt, anafylaktisk shock eller føetal lungemodning ved risiko for preterm fødsel.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Væsentlige ulemper

Der foreligger sparsomme data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til gravide covid-19.

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø og antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt. Evidensgrundlaget fra voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til gravide med covid-19 uden behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos gravide med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis død af alle årsager hos gravide med covid-19 uden behov for iltbehandling. Analyser viser, at der blandt voksne er 38 flere dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyser viser, at der blandt voksne er 39 flere events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage hos gravide uden behov for iltbehandling.

Kritiske outcomes (gravide uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis behov for invasiv respiratorbehandling eller død (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (gravide uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage i betydelig grad (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for gravide med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav

tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen er samlet set lav, idet der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter primært voksne med covid-19, og gravide var kun i meget begrænset omfang inkluderet i forsøgene (4 gravide i alt). Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population (extrapolation).

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie og bredt konfidensinterval) og det kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* er nedgraderet én gang på grund af alvorlig upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Vi forventer at få patienter vil vælge interventionen

Hvis patienterne informeres grundigt om gavnlige og skadelige virkninger forventes der ikke stor variation i patientpræferencer.

Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for ikke at modtage interventionen grundet risiko for skadelige effekter, og bekymring om påvirkning af fosteret ved behandling med systemisk glukokortikoid, om end der ikke er fundet overbevisende dokumentation for sidstnævnte [4][12].

Da anbefalingerne for iltkrævende og ikke-iltkrævende gravide går i hver sin retning, kan der være variation i patientpræferencer i en hvis udstrækning. Nogle patienter vil måske foretrække systemisk glukokortikoid, selvom de ikke har behov for ilt, i håbet om at det kan forebygge progression af sygdommen. En forklaring til patient og pårørende af forskellen på forebyggelse af forværring i tilstanden (alvorlig sygdom) versus behandling af kritisk sygdom kan i den sammenhæng være hjælpsom.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ressourceforbrug.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes, at være acceptabelt for både patienter og sundhedspersonale.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes ikke, at udgøre en praktisk udfordring.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis øger dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til

gravide med covid-19 uden behov for ilt.

Samtidig forventes patienterne i overvejende grad, at ville afstå fra interventionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er usandsynligt, at interventionen har gavnlige virkninger for gravide med covid-19 uden behov for ilt.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Pregnant women with covid-19 who do not require oxygen [adapted from general adult population]

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard care

Sammenfatning

See summary for 'pregnant women with COVID-19 [adapted from the adult population] - Corticosteroids vs Standard care'.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Se evidensprofil for systemisk glukokortikoid til gravide med behov for ilt under afsnit 4.2.1.1					

4.3 Systemisk glukokortikoid til ammende

4.3.1 Systemisk glukokortikoid til ammende med behov for ilt

Stærk anbefaling

Anvend systemisk glukokortikoid til ammende med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom).

Det anbefales at anvende prednisolon 40 mg x 1 per oral (PO) eller hydrocortison 80 mg x 2 intravenøst (IV) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx. udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid.

Flere ammende har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden, at der er fundet overbevisende dokumentation for skadelig påvirkning af spædbarnet ved kortidsanvendelse.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Overvejende fordele ved det anbefalede alternativ

Der foreligger ikke data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til ammende covid-19.

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø og antallet af patienter med behov for *invasiv respiratorbehandling* hos voksne med covid-19 med behov for ilt. Evidensgrundlaget for voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til ammende med covid-19 med behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos ammende med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø hos ammende med covid-19 og behov for iltbehandling. Analyser viser, at der blandt voksne er 51 færre dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis også det sammensatte outcome *invasiv respiratorbehandling eller død*. Analyser viser, at der blandt voksne er 38 færre events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser blandt ammende med behov for iltbehandling, men øger sandsynligvis antal patienter med hyperglykæmi.

Flere ammende har været eksponeret for systemisk glukokortikoid uden, at der er fundet overbevisende dokumentation for skadelig påvirkning af spædbarnet ved kortidsanvendelse [18].

Præparatvalget er i overensstemmelse med anbefalingerne for de gravide og i overensstemmelse med andre anbefalinger for brug af systemisk glukokortikoid under amning [14]/[13]

Kritiske outcomes (ammende med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis behov for *invasiv respiratorbehandling* eller død (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (ammende med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af alvorlige hændelser (inden for 28 dage) i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for ammende med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen for de kritiske outcomes er samlet set lav, idet der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter voksne med covid-19, og ammende var ikke repræsenteret i de inkluderede forsøg.
Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population.

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorlig heterogenitet (retning af effekt ikke konsistent) og det sammensatte kritiske outcome *invasiv mekanisk ventilation eller død* er nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Ingen betydelig variation forventet

Det forventes, at både patienter og pårørende overvejende vil foretrække interventionen.

Ammende med behov for ilt er kritisk syge og i risiko for et alvorligt forløb, hvorfor det forventes, at de fleste patienter og pårørende vil foretrække behandlingen. Derudover vil flere kritisk syge ammende ikke være i stand til at amme.

Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for interventionen grundet overvejende gavnlige effekter, og fravær af overbevisende dokumentation for skadelig påvirkning af spædbarn [12][18].

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider er alment tilgængelige og billige.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Behandling med systemisk glukortikoid forventes ikke at føre til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider anvendes i forvejen til mange patientgrupper, hvorfor behandlingen forventes at være acceptabel for både patienter og sundhedspersonale.

Det vurderes ikke, at anvendelse af systemisk glukokortikoid til ammende med iltkrævende (alvorlig/kritisk) covid-19 har betydning for tilgængeligheden af dette lægemiddel til andre patientgrupper.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Der forventes ikke at være udfordringer med tilgængeligheden af systemisk glukokortikoid, og en af de alternative formuleringer (hydrocortison eller prednisolon) kan i givet fald anvendes.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis reducerer dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til ammende med covid-19 med behov for ilt.

Der var enighed om en stærk anbefaling for systemisk glukokortikoid til denne population til trods for lav tiltro til evidensen grundet extrapolation.

Arbejdsgruppen vurderede, at de gavnlige effekter i forhold til reduceret dødelighed og nedsat behov for invasiv mekanisk ventilation klart overstiger de sandsynlige skadelige virkninger i form af øget antal patienter med hyperglykæmi.

Patientpræferencerne forventes at være ensartede til fordel for intervention.

Der er erfaring med behandling med systemisk glukortikoid til ammende på andre indikationer, herunder autoimmune sygdomme, og der er ikke fundet overbevisende dokumentation for påvirkning af spædbarnet ved korttidsanvendelse.

Fokuseret Spørgsmål

Population:	Breastfeeding women with covid-19 who require oxygen [adapted from general adult population]
Intervention:	Corticosteroids
Sammenligning:	Standard care

Sammenfatning

Evidence indicates that corticosteroids reduce deaths in patients with critical or severe COVID-19, but may increase deaths in patients with moderate COVID-19.

What is the evidence informing this recommendation?

Evidence comes from a meta-analysis and associated living guidance [25] of seven randomised trials of patients with critical COVID-19 [8][9][3][23][24][15][16], one study of patients with moderate, severe and critical COVID-19 [20], and one study of patients with severe COVID-19 [10]. Over 5700 patients are included in the meta-analysis. All trials compared corticosteroids plus standard care with standard care alone.

In addition, two meta-analyses of corticosteroids for other conditions—other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia, acute respiratory distress [26] and sepsis [21]—provided indirect evidence for serious adverse events.

Three new studies comparing corticosteroids with standard care were found [6][11][22]. These studies are currently under review and, although not expected to change the recommendation, an updated recommendation will be included in a future version of the guideline.

Study characteristics

Three studies compared dexamethasone with standard care [23][24][20], three compared hydrocortisone with standard care [8][3][16] and three compared methylprednisolone with standard care [9][15][10].

Disease severity was reported independently for each trial. Definitions included patients who required mechanical ventilation or NIV, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, positive end-expiratory pressure (PEEP) $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$, and the presence of pneumonia or infiltrates on chest imaging.

Mean or median age ranged from 57 to 67 years in the corticosteroid groups and from 60 to 66 years in the standard care groups. The proportion of women was 32% (range 13% to 43%) in the corticosteroid groups and 29% (range 21% to 36%) in the standard care groups.

What are the main results?

Compared with standard care, corticosteroids probably reduce death in patients with severe and critical COVID-19. For every 1000 patients given corticosteroids, 51 more are likely to survive compared with those receiving standard care (RR 0.84 CI 95% 0.73 to 0.98; 5789 patients in 9 studies). Corticosteroids in patients requiring oxygen also probably reduce the composite outcome of requirement for invasive mechanical ventilation or death, and time to discharge from hospital.

In patients who do not require oxygen, corticosteroids probably increase death (RR 1.27 CI 95% 1.00 to 1.61; 1535 patients in 1 study) and the composite outcome of invasive mechanical ventilation or death.

Indirect evidence of corticosteroid use in patients with other, similar indications shows no difference in the incidence of gastrointestinal bleeding, superinfections, neuromuscular weakness and neuropsychiatric effects. However, corticosteroid use was associated with an increase in hyperglycaemia (RR 1.16 CI 95% 1.08 to 1.25; 8938 patients in 8 studies).

Our confidence in the results

Certainty of the evidence for all outcomes is judged to be low for pregnant and breastfeeding women, and children and adolescents due to serious indirectness. This is in addition to concerns in the adult population about inconsistency in direction of effect and serious imprecision.

Additional information

Pregnant and breastfeeding women

A total of 4 pregnant women (from RECOVERY trial [20]) and no breastfeeding women were included in the meta-analysis.

Children and adolescents

Very few (unspecified) children/adolescents (from RECOVERY trial [20]) were included in the meta-analysis.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
All-cause mortality [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment 9 Kritisk	Relative risiko 0.84 (CI 95% 0.73 – 0.98) Baseret på data fra 5,789 patienter i 9 studier. ¹ (Randomiserede studier)	316 per 1.000 Forskel:	265 per 1.000 51 færre per 1.000 (CI 95% 85 færre – 6 færre)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ²	Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos ammende med behov for iltbehandling
Invasive mechanical ventilation or death [adults requiring oxygen] ³ Within 28 days after commencing treatment 9 Kritisk	Relative risiko 0.88 (CI 95% 0.79 – 0.97) Baseret på data fra 3,883 patienter i 11 studier. ⁴ (Randomiserede studier)	320 per 1.000 Forskel:	282 per 1.000 38 færre per 1.000 (CI 95% 67 færre – 10 færre)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ⁵	Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos ammende med behov for iltbehandling
Serious adverse events [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.8 (CI 95% 0.53 – 1.19) Baseret på data fra 696 patienter i 6 studier. ⁶ (Randomiserede studier)	234 per 1.000 Forskel:	187 per 1.000 47 færre per 1.000 (CI 95% 110 færre – 44 flere)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁷	Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser (inden for 28 dage) blandt ammende med behov for iltbehandling i betydelig grad

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
6 Vigtig					
Discharge from hospital [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.1 (CI 95% 1.06 – 1.15) Baseret på data fra 4,952 patienter i 2 studier. ⁸ (Randomiserede studier)	582 per 1.000 Forskel:	640 per 1.000 58 flere per 1.000 (CI 95% 35 flere – 87 flere)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁹	Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt ammende med behov for iltbehandling
All-cause mortality [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 1.27 (CI 95% 1 – 1.61) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁰ (Randomiserede studier)	140 per 1.000 Forskel:	178 per 1.000 38 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 85 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹¹	Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos ammende uden behov for iltbehandling
Invasive mechanical ventilation or death [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 1.25 (CI 95% 1 – 1.57) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹² (Randomiserede studier)	155 per 1.000 Forskel:	194 per 1.000 39 flere per 1.000 (CI 95% 0 færre – 88 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹³	Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos ammende uden behov for iltbehandling
Discharge from hospital [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 0.96 (CI 95% 0.9 – 1.01) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁴ (Randomiserede studier)	804 per 1.000 Forskel:	772 per 1.000 32 færre per 1.000 (CI 95% 80 færre – 8 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt ammende uden behov for iltbehandling i betydelig grad

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Gastrointestinal bleeding End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.06 (CI 95% 0.85 – 1.33) Baseret på data fra 5,403 patienter i 30 studier. ¹⁶	48 per 1.000 Forskel:	51 per 1.000 3 flere per 1.000 (CI 95% 7 færre – 16 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁷	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad
Super infections End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.01 (CI 95% 0.9 – 1.13) Baseret på data fra 6,027 patienter i 32 studier. ¹⁸	186 per 1.000 Forskel:	188 per 1.000 2 flere per 1.000 (CI 95% 19 færre – 24 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁹	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektion i betydelig grad
Hyperglycaemia End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.16 (CI 95% 1.08 – 1.25) Baseret på data fra 8,938 patienter i 24 studier. ²⁰	286 per 1.000 Forskel:	332 per 1.000 46 flere per 1.000 (CI 95% 23 flere – 72 flere)	Moderat På grund af alvorlig manglende overførbarhed ²¹	Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi
Neuromuscular weakness End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.09 (CI 95% 0.86 – 1.39) Baseret på data fra 6,358 patienter i 8 studier. ²²	69 per 1.000 Forskel:	75 per 1.000 6 flere per 1.000 (CI 95% 10 færre – 27 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²³	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad
Neuropsychiatric effects End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 0.81 (CI 95% 0.41 – 1.63) Baseret på data fra 1,813 patienter i 7 studier. ²⁴	35 per 1.000 Forskel:	28 per 1.000 7 færre per 1.000 (CI 95% 21 færre – 22 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatrisk effekt i betydelig grad

1. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: Edalatifard 2020, RECOVERY, METCOVID 2020, Steroids-SARI 2020, CoDEX 2020, CAPE COVID 2020, COVID STEROID 2020, RECOVERY, REMAP-CAP 2020, DEXA-COVID 19 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
2. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
- Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.
3. The number of patients with severe illness (i.e. who do not require mechanical ventilation at enrolment) that progress to requiring invasive mechanical ventilation or death within 28 days
4. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.

5. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
6. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: DEXA-COVID 19 2020, REMAP-CAP 2020, CoDEX 2020, Steroids-SARI 2020, COVID STEROID 2020, CAPE COVID 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
7. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
Manglende overførbarhed: alvorligt. Differences between the population of interest and those studied.
8. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY, RECOVERY, Edalatifard 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
9. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
Manglende overførbarhed: alvorligt. Differences between the population of interest and those studied.
10. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
11. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Only data from one study, Wide confidence intervals.
12. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
13. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
14. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
15. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
16. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
17. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
18. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
19. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
20. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
21. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.
22. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
23. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
24. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
25. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.

Referencer

2. Systemic corticosteroids for COVID-19.
3. Angus DC, Derde L, Al-Beidh F, Annane D, Arabi Y, Beane A, et al. : Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
8. Dequin P-F, Heming N, Meziani F, Plantefève G, Voiriot G, Badié J, et al. : Effect of hydrocortisone on 21-day mortality or respiratory support among critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
9. Du B, Weng LI : Glucocorticoid therapy for COVID-19 critically ill patients with severe acute respiratory failure. ClinicalTrials.gov 2020; [Link](#)
10. Edalatifard M, Akhtari M, Salehi M, Naderi Z, Jamshidi A, Mostafaei S, et al. : Intravenous methylprednisolone pulse as a treatment for hospitalised severe COVID-19 patients: results from a randomised controlled clinical trial. European Respiratory Journal 2020; [Pubmed Journal](#)
15. Jeronimo CMP, Farias MEL, Val FFA, Sampaio VS, Alexandre MAA, Melo GC, et al. : Methylprednisolone as adjunctive therapy for patients hospitalized with COVID-19 (Metcovid): a randomised, double-blind, phase IIb,

placebo-controlled trial. Clinical Infectious Diseases 2020; [Pubmed Journal](#)

16. Munch MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjaer M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia: the COVID STEROID randomised, placebo-controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2021; [Pubmed Journal](#)

20. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al. : Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal Link](#)

21. Rochwerg B, Oczkowski SJ, Siemieniuk RAC, Agoritsas T, Belley-Cote E, D'Aragon F, et al. : Corticosteroids in sepsis: an updated systematic review and meta-analysis. Critical Care Medicine 2018;46(9):1411-1420 [Pubmed Journal](#)

23. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, Berwanger O, Rosa RG, Veiga VC, et al. : Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)

24. Villar J, Añón JM, Ferrando C, Aguilar G, Muñoz T, Ferreres J, et al. : Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. Trials 2020;21(1):717 [Pubmed Journal](#)

25. World Health Organization : Corticosteroids for COVID-19, Living Guidance. 2 September 2020; [Link](#)

26. Ye Z, Wang Y, Colunga-Lozano LE, Prasad M, Tangamornsuksan W, Rochwerg B, et al. : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19 based on evidence for COVID-19, other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2020;192(27):E756-E767 [Pubmed Journal](#)

4.3.2 Systemisk glukokortikoid til ammende uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til ammende med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til ammende med covid-19, fx. autoimmune sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, svært kredsløbssvigt, og anafylaktisk shock.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Væsentlige ulemper

Der foreligger ikke data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til ammende covid-19.

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt. Evidensgrundlaget fra voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til ammende med covid-19 uden behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos ammende med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø hos ammende med covid-19 uden behov for iltbehandling. Analyser viser, at blandt voksne er der 38 flere dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis også det sammensatte outcome *invasiv respiratorbehandling eller død*. Analyser viser, at der blandt voksne er 39 flere events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage hos ammende uden behov for iltbehandling.

Kritiske outcomes (ammende uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis behov for *invasiv respiratorbehandling* eller død (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (ammende uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage i betydelig grad (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for ammende med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen for de kritiske outcomes er samlet set lav, idet der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter voksne med covid-19 og ammende var ikke repræsenteret i de inkluderede forsøg. Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population.

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie og bredt konfidensinterval) og det sammensatte kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* er nedgraderet én gang på grund af alvorlig upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Vi forventer at få patienter vil vælge interventionen

Hvis patienterne informeres grundigt om gavnlige og skadelige virkninger, forventes der ikke stor variation i patientpræferencer.

Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for ikke at modtage interventionen grundet risiko for skadelige effekter, og bekymring om påvirkning af spædbarn, selvom der ikke er fundet overbevisende dokumentation for sidstnævnte [12][18].

Da anbefalingerne for iltkrævende og ikke-iltkrævende ammanede går i hver sin retning, kan der være variation i patientpræferencer i en hvis udstrækning. Nogle patienter vil måske foretrække systemisk glukokortikoid, selvom de ikke har behov for ilt, i håbet om at det kan forebygge progression af sygdommen. En forklaring af forskellen på forebyggelse af forværring i tilstanden (alvorlig sygdom) versus behandling af kritisk sygdom kan i den sammenhæng være hjælpsom.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ressourceforbrug.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes, at være acceptabelt for både patienter og sundhedspersonale.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes ikke, at udgøre en praktisk udfordring.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis øger dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til ammende med covid-19 uden behov for ilt.

Samtidig forventes patienterne i overvejende grad at ville afstå fra interventionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er usandsynligt at interventionen har gavnlige virkninger for ammende med covid-19 uden behov for ilt.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Breastfeeding women with covid-19 who do not require oxygen [adapted from general adult population]

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard care

Sammenfatning

See summary for 'Special populations with COVID-19 [adapted from the adult population] - Corticosteroids vs Standard care'.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	------------

Se evidensprofil
for systemisk
glukokortikoid
til ammende
med behov for
ilt under afsnit
4.3.1.1

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag

4.4 Systemisk glukokortikoid til børn og unge

4.4.1 Systemisk glukokortikoid til børn og unge med behov for ilt

Svag anbefaling

Overvej at anvende systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19 med behov for ilt (alvorlig/kritisk sygdom)

Anbefalingen gælder børn og unge under 16 år.

Det anbefales at anvende dexamethason 0.15 mg/kg/dag (max 6 mg/dag) i 10 dage. Kortere behandlingsvarighed kan overvejes ved fx udskrivelse fra hospital eller eksisterende anvendelse af systemisk glukokortikoid. Behandlingen kan gives per oral (PO) eller intravenøst (IV).

Hvis dexamethason ikke er tilgængeligt, kan følgende alternative systemiske glukokortikoider anvendes:

- Hydrocortison 1 mg/kg x 4 IV (max 50 mg x 4) i op til 10 dage
- Prednisolon 1 mg/kg x 1 PO (max 50 mg) i op til 10 dage
- Methylprednisolon 0.8 mg/kg x 1 IV/PO (max 40 mg) i op til 10 dage

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Overvejende fordele ved det anbefalede alternativ

Der foreligger sparsomme data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19.

Systemisk glukokortikoid nedsætter sandsynligvis risikoen for at dø og antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt. Evidensgrundlaget for voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til børn og unge med covid-19 med behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos børn og unge med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø hos børn og unge med covid-19 og behov for iltbehandling. Analyser viser, at blandt voksne er der 51 færre dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyser viser, at der blandt voksne er 38 færre events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser hos børn og unge med behov for iltbehandling, men øger sandsynligvis antal patienter med hyperglykæmi.

Kritiske outcomes (børn og unge med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis antallet af patienter behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (børn og unge med behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af alvorlige hændelser i betydelig grad (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter der udskrives fra hospital inden for 28 dage (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for børn og unge med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen for de kritiske outcomes er samlet set lav, idet der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter primært voksne med covid-19, og børn og unge var kun i meget begrænset omfang inkluderet i forsøgene (meget få børn og unge, antal uspecifieret). Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population.

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorlig heterogenitet (retning af effekt ikke konsistent), og det sammensatte kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* er nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Ingen betydelig variation forventet

Det forventes, at både patienter (børn/unge) og pårørende (forældre) overvejende vil foretrække interventionen.

Børn og unge har mindre risiko for et alvorligt forløb end voksne, hvorfor det forventes at de fleste, men ikke alle, vil foretrække behandlingen.

Patientpræferencer forventes overvejende at være ensartede til fordel for interventionen grundet overvejende gavnlige effekter.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider er alment tilgængelige og billige.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Behandling med systemisk glukortikoid forventes ikke at føre til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Systemiske glukokortikoider anvendes i forvejen til mange patientgrupper, hvorfor behandlingen forventes at være acceptabel for både patienter og sundhedspersonale.

Det vurderes ikke, at anvendelse af systemisk glukokortikoid til børn og unge med iltkrævende (alvorlig/kritisk) covid-19 har betydning for tilgængeligheden af dette lægemiddel til andre patientgrupper.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Der forventes ikke at være udfordringer med tilgængeligheden af systemisk glukokortikoid.

Rationale

Der blev i formuleringen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis reducerer dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 med behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til børn og unge med covid-19 med behov for ilt.

Der var enighed om en svag anbefaling for systemisk glukokortikoid til denne population på baggrund af lav tiltro til effekten grundet extrapolation, og da børn og unge i mindre grad end voksne og gravide/ammende er i risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Arbejdsgruppen vurderede, at de gavnlige effekter i forhold til reduceret dødelighed og nedsat behov for invasiv mekanisk ventilation klart overstiger de sandsynlige skadelige virknings i form af øget antal patienter med hyperglykæmi.

Patientpræferencerne forventes at være ensartede til fordel for intervention.

Der er erfaring med behandling med systemisk glukortikoid til børn og unge på andre indikationer, herunder autoimmune sygdomme og meningitis.

Fokuseret Spørgsmål

Population: Children or adolescents below 16 years with covid-19 who require oxygen [adapted from general adult population]

Intervention: Corticosteroids

Sammenligning: Standard care

Sammenfatning

Evidence indicates that corticosteroids reduce deaths in patients with critical or severe COVID-19, but may increase deaths in patients with moderate COVID-19.

What is the evidence informing this recommendation?

Evidence comes from a meta-analysis and associated living guidance [25] of seven randomised trials of patients with critical COVID-19 [8][9][3][23][24][15][16], one study of patients with moderate, severe and critical COVID-19 [20], and one study of patients with severe COVID-19 [10]. Over 5700 patients are included in the meta-analysis. All trials compared corticosteroids plus standard care with standard care alone.

In addition, two meta-analyses of corticosteroids for other conditions—other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia, acute respiratory distress [26] and sepsis [21]—provided indirect evidence for serious adverse events.

Three new studies comparing corticosteroids with standard care were found [6][11][22]. These studies are currently under review and, although not expected to change the recommendation, an updated recommendation will be

included in a future version of the guideline.

Study characteristics

Three studies compared dexamethasone with standard care [23][24][20], three compared hydrocortisone with standard care [8][3][16] and three compared methylprednisolone with standard care [9][15][10].

Disease severity was reported independently for each trial. Definitions included patients who required mechanical ventilation or NIV, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, positive end-expiratory pressure (PEEP) $\geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$, and the presence of pneumonia or infiltrates on chest imaging.

Mean or median age ranged from 57 to 67 years in the corticosteroid groups and from 60 to 66 years in the standard care groups. The proportion of women was 32% (range 13% to 43%) in the corticosteroid groups and 29% (range 21% to 36%) in the standard care groups.

What are the main results?

Compared with standard care, corticosteroids probably reduce death in patients with severe and critical COVID-19. For every 1000 patients given corticosteroids, 51 more are likely to survive compared with those receiving standard care (RR 0.84 CI 95% 0.73 to 0.98; 5789 patients in 9 studies). Corticosteroids in patients requiring oxygen also probably reduce the composite outcome of requirement for invasive mechanical ventilation or death, and time to discharge from hospital.

In patients who do not require oxygen, corticosteroids probably increase death (RR 1.27 CI 95% 1.00 to 1.61; 1535 patients in 1 study) and the composite outcome of invasive mechanical ventilation or death.

Indirect evidence of corticosteroid use in patients with other, similar indications shows no difference in the incidence of gastrointestinal bleeding, superinfections, neuromuscular weakness and neuropsychiatric effects. However, corticosteroid use was associated with an increase in hyperglycaemia (RR 1.16 CI 95% 1.08 to 1.25; 8938 patients in 8 studies).

Our confidence in the results

Certainty of the evidence for all outcomes is judged to be low for pregnant and breastfeeding women, and children and adolescents due to serious indirectness. This is in addition to concerns in the adult population about inconsistency in direction of effect and serious imprecision.

Additional information

Pregnant and breastfeeding women

A total of 4 pregnant women (from RECOVERY trial [20]) and no breastfeeding women were included in the meta-analysis.

Children and adolescents

Very few (unspecified) children/adolescents (from RECOVERY trial [20]) were included in the meta-analysis.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
All-cause mortality [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.84 (CI 95% 0.73 – 0.98) Baseret på data fra 5.789 patienter i 9 studier. ¹ (Randomiserede studier)	316 per 1.000 Forskell:	265 per 1.000 51 færre per 1.000 (CI 95% 85 færre – 6 færre)	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater. På grund af alvorlig manglerne overførbarhed ²	Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos børn og unge med behov for iltbehandling (lav tiltro)

9 Kritisk

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Invasive mechanical ventilation or death [adults requiring oxygen] ³ Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 0.88 (CI 95% 0.79 – 0.97) Baseret på data fra 3,883 patienter i 1 studier. ⁴ (Randomiserede studier)	320 per 1.000	282 per 1.000	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ⁵	Systemisk glukokortikoid nedsætter muligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos børn og unge med behov for iltbehandling
9 Kritisk					
Serious adverse events [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 0.8 (CI 95% 0.53 – 1.19) Baseret på data fra 696 patienter i 6 studier. ⁶ (Randomiserede studier)	234 per 1.000	187 per 1.000	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁷	Systemisk glukokortikoid øger muligvis ikke antallet af patienter med alvorlige hændelser i betydelig grad (inden for 28 dage) blandt børn og unge med behov for iltbehandling
6 Vigtig					
Discharge from hospital [adults requiring oxygen] Within 28 days of commencing treatment	Relative risiko 1.1 (CI 95% 1.06 – 1.15) Baseret på data fra 4,952 patienter i 2 studier. ⁸ (Randomiserede studier)	582 per 1.000	640 per 1.000	Lav På grund af alvorlig inkonsistente resultater, På grund af alvorlig manglende overførbarhed ⁹	Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt børn og unge med behov for iltbehandling
6 Vigtig					
All-cause mortality [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment	Relative risiko 1.27 (CI 95% 1 – 1.61) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁰ (Randomiserede studier)	140 per 1.000	178 per 1.000	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹¹	Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (inden for 28 dage) hos børn og unge uden behov for iltbehandling
9 Kritisk					
Invasive mechanical ventilation or death [adults not requiring oxygen] Within 28 days	Relative risiko 1.25 (CI 95% 1 – 1.57) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹² (Randomiserede studier)	155 per 1.000	194 per 1.000	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist	Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
after commencing treatment 9 Kritisk			— 88 flere)	effektestimat ¹³ (inden for 28 dage) hos børn og unge uden behov for iltbehandling	
Discharge from hospital [adults not requiring oxygen] Within 28 days after commencing treatment 6 Vigtig	Relative risiko 0.96 (CI 95% 0.9 – 1.01) Baseret på data fra 1,535 patienter i 1 studier. ¹⁴ (Randomiserede studier)	804 per 1.000 Forskel:	772 per 1.000 32 færre per 1.000 (CI 95% 80 færre – 8 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁵ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrivelse fra hospital inden for 28 dage blandt børn og unge uden behov for iltbehandling i betydelig grad	
Gastrointestinal bleeding End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.06 (CI 95% 0.85 – 1.33) Baseret på data fra 5,403 patienter i 30 studier. ¹⁶	48 per 1.000 Forskel:	51 per 1.000 3 flere per 1.000 (CI 95% 7 færre – 16 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁷ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad	
Super infections End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.01 (CI 95% 0.9 – 1.13) Baseret på data fra 6,027 patienter i 32 studier. ¹⁸	186 per 1.000 Forskel:	188 per 1.000 2 flere per 1.000 (CI 95% 19 færre – 24 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ¹⁹ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektion i betydelig grad	
Hyperglycaemia End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.16 (CI 95% 1.08 – 1.25) Baseret på data fra 8,938 patienter i 24 studier. ²⁰	286 per 1.000 Forskel:	332 per 1.000 46 flere per 1.000 (CI 95% 23 flere – 72 flere)	Moderat På grund af alvorlig manglende overførbarhed ²¹ Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antal patienter med hyperglykæmi	
Neuromuscular weakness End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 1.09 (CI 95% 0.86 – 1.39) Baseret på data fra 6,358 patienter i 8 studier. ²²	69 per 1.000 Forskel:	75 per 1.000 6 flere per 1.000 (CI 95% 10 færre – 27 flere)	Lav På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²³ Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad	

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Neuropsychiatric effects End of treatment 6 Vigtig	Relative risiko 0.81 (CI 95% 0.41 – 1.63) Baseret på data fra 1,813 patienter i 7 studier. ²⁴	35 per 1.000 Forskel:	28 per 1.000 7 færre per 1.000 (CI 95% 21 færre – 22 flere)	Lav manglende overførbarhed, upræcist effektestimat, På grund af alvorlig manglende overførbarhed, På grund af alvorlig upræcist effektestimat ²⁵	Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatrisk effekt i betydelig grad

1. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: Edalatifard 2020, CoDEX 2020, COVID STEROID 2020, Steroids-SARI 2020, METCOVID 2020, RECOVERY, CAPE COVID 2020, DEXA-COVID 19 2020, REMAP-CAP 2020, RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
2. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
Manglende overførbarhed: alvorligt. Differences between the population of interest and those studied.
3. The number of patients with severe illness (i.e. who do not require mechanical ventilation at enrolment) that progress to requiring invasive mechanical ventilation or death within 28 days
4. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
5. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
6. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: DEXA-COVID 19 2020, CAPE COVID 2020, COVID STEROID 2020, Steroids-SARI 2020, CoDEX 2020, REMAP-CAP 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
7. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
Manglende overførbarhed: alvorligt. Differences between the population of interest and those studied.
8. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY, RECOVERY, Edalatifard 2020. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
9. **Inkonsistente resultater: alvorligt.** The direction of the effect is not consistent between the included studies.
Manglende overførbarhed: alvorligt. Differences between the population of interest and those studied.
10. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
11. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study, Wide confidence intervals.
12. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
13. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
14. Systematisk oversigtsartikel [2] med inkluderede studier: RECOVERY. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
15. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Only data from one study.
16. Systematisk oversigtsartikel [25]. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
17. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
18. Systematisk oversigtsartikel [25]. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
19. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcist effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
20. Systematisk oversigtsartikel [25]. **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
21. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied.

22. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
23. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.
24. Systematisk oversigtsartikel [25] . **Baselinerisiko/komparator:** Kontrolarm i reference brugt til interventionen.
25. **Manglende overførbarhed: alvorligt.** Differences between the population of interest and those studied. **Upræcisit effektestimat: alvorligt.** Wide confidence intervals.

Referencer

2. Systemic corticosteroids for COVID-19.
3. Angus DC, Derde L, Al-Beidh F, Annane D, Arabi Y, Beane A, et al. : Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
8. Dequin P-F, Heming N, Meziani F, Plantefève G, Voiriot G, Badié J, et al. : Effect of hydrocortisone on 21-day mortality or respiratory support among critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
9. Du B, Weng LI : Glucocorticoid therapy for COVID-19 critically ill patients with severe acute respiratory failure. ClinicalTrials.gov 2020; [Link](#)
10. Edalatifard M, Akhtari M, Salehi M, Naderi Z, Jamshidi A, Mostafaei S, et al. : Intravenous methylprednisolone pulse as a treatment for hospitalised severe COVID-19 patients: results from a randomised controlled clinical trial. European Respiratory Journal 2020; [Pubmed Journal](#)
15. Jeronimo CMP, Farias MEL, Val FFA, Sampaio VS, Alexandre MAA, Melo GC, et al. : Methylprednisolone as adjunctive therapy for patients hospitalized with COVID-19 (Metcovid): a randomised, double-blind, phase IIb, placebo-controlled trial. Clinical Infectious Diseases 2020; [Pubmed Journal](#)
16. Munch MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjaer M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia: the COVID STEROID randomised, placebo-controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2021; [Pubmed Journal](#)
20. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al. : Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal](#) [Link](#)
21. Rochwerg B, Oczkowski SJ, Siemieniuk RAC, Agoritsas T, Belley-Cote E, D'Aragon F, et al. : Corticosteroids in sepsis: an updated systematic review and meta-analysis. Critical Care Medicine 2018;46(9):1411-1420 [Pubmed Journal](#)
23. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, Berwanger O, Rosa RG, Veiga VC, et al. : Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)
24. Villar J, Añón JM, Ferrando C, Aguilar G, Muñoz T, Ferreres J, et al. : Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. Trials 2020;21(1):717 [Pubmed Journal](#)
25. World Health Organization : Corticosteroids for COVID-19, Living Guidance. 2 September 2020; [Link](#)
26. Ye Z, Wang Y, Colunga-Lozano LE, Prasad M, Tangamornsuksan W, Rochwerg B, et al. : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19 based on evidence for COVID-19, other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2020;192(27):E756-E767 [Pubmed Journal](#)

4.4.2 Systemisk glukokortikoid til børn og unge uden behov for ilt

Stærk anbefaling mod

Anvend ikke systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19 uden behov for ilt (mild/moderat sygdom), da det er usandsynligt, at behandlingen samlet set er gavnlig for denne gruppe af patienter.

Anbefalingen gælder børn og unge under 16 år.

Systemisk glukokortikoid kan fortsat anvendes på andre evidensbaserede indikationer til børn og unge med covid-19, fx autoimmune sygdomme, astmatisk bronkitis, alvorlige infektionssygdomme inklusiv meningitis, svært lungesvigt, og anafylaktisk shock.

Nøgleinformationer

Gavnlige og skadelige virkninger

Væsentlige ulemper

Der foreligger sparsomme data fra kliniske forsøg om behandling med systemisk glukokortikoid til børn og unge med covid-19.

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis risikoen for at dø og antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt. Evidensgrundlaget fra voksne forventes i nogen grad at kunne overføres til børn og unge med covid-19 uden behov for ilt.

Tiltro til gavnlige og skadelige effekter hos børn og unge med covid-19 (baseret på ekstrapolation fra voksne med covid-19)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø blandt børn og unge med covid-19 uden behov for iltbehandling. Analyser viser, at blandt voksne er der 38 flere dødsfald per 1000 patienter indenfor 28 dage ved behandling med systemisk glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid øger muligvis også det sammensatte outcome 'invasiv respiratorbehandling eller død'. Analyser viser, at der blandt voksne er 39 flere events per 1000 patienter ved behandling med systemiske glukokortikoid sammenlignet med standardbehandling alene.

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage blandt børn og unge uden behov for iltbehandling.

Kritiske outcomes (børn og unge uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis risikoen for at dø (af alle årsager, inden for 28 dage) (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger muligvis antallet af patienter med behov for invasiv respiratorbehandling eller risikoen for at dø (inden for 28 dage) (lav tiltro)

Vigtige outcomes (børn og unge uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter, der udskrives fra hospital inden for 28 dage (lav tiltro)

Vigtige outcomes (opgjort samlet for børn og unge med og uden behov for ilt)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med gastrointestinal blødning i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med superinfektioner i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid øger sandsynligvis antallet af patienter med hyperglykæmi (moderat tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuromuskulær svækkelse i betydelig grad (lav tiltro)

Systemisk glukokortikoid påvirker muligvis ikke antallet af patienter med neuropsykiatriske effekter i betydelig grad (lav tiltro)

Kvaliteten af evidensen

Lav

Kvaliteten af evidensen for de kritiske outcomes er samlet set lav, i det der er lav tiltro til de to kritiske outcomes.

Evidensgrundlaget omfatter primært voksne med covid-19, og børn og unge var kun i meget begrænset omfang inkluderet i studierne (meget få børn og unge, antal uspecifieret). Kvaliteten af evidensen er derfor nedgraderet én gang på grund af indirekte population.

Herudover er det kritiske outcome *død af alle årsager* nedgraderet én gang på grund af alvorlig heterogenitet (retning af effekt ikke konsistent), og det sammensatte kritiske outcome *invasiv respiratorbehandling eller død* er nedgraderet én gang på grund af alvorligt upræcist effektestimat (kun ét studie).

Patientpræferencer

Vi forventer at få patienter vil vælge interventionen

Hvis patienter og pårørende informeres grundigt om gavnlige og skadelige virkninger ved behandlingen, forventes der ikke stor variation i patientpræferencer.

Da anbefalingerne for iltkrævende og ikke-iltkrævende børn/unge går i hver sin retning, kan der være variation i patientpræferencer i en hvis udstrækning. Nogle patienter vil måske foretrække systemisk glukokortikoid, selvom de ikke har behov for ilt, i håbet om at det kan forebygge progression af sygdommen. En forklaring af forskellen på forebyggelse af forværring i tilstanden (alvorlig sygdom) versus behandling af kritisk sygdom kan i den sammenhæng være hjælpsom.

Ressourcer

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ressourceforbrug.

Lighed i sundhed

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod brug af systemisk glukokortikoid forventes ikke, at skabe udfordringer i forhold til ulighed i sundhed.

Accept

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes, at være acceptabelt for både patienter og sundhedspersonale.

Feasibility

Ingen væsentlige problemer med anbefalet alternativ

Anbefalingen imod systemisk glukokortikoid forventes ikke, at udgøre en praktisk udfordring.

Rationale

Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at systemisk glukokortikoid sandsynligvis øger dødelighed og behov for invasiv respiratorbehandling hos voksne med covid-19 uden behov for ilt, og at dette forventes at kunne overføres til børn og unge med covid-19 uden behov for ilt.

Samtidig forventes patienterne i overvejende grad at ville afstå fra interventionen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er usandsynligt, at interventionen har gavnlige virkninger for børn og unge med covid-19 uden behov for ilt.

Fokuseret Spørgsmål

- Population:** Children or adolescents below 16 years with covid-19 who do not require oxygen [adapted from general adult population]
- Intervention:** Corticosteroids
- Sammenligning:** Standard care

Sammenfatning

See summary for 'Children and adolescents with COVID-19 [adapted from the adult population] - Corticosteroids vs Standard care'.

Outcome Tidsramme	Resultater og målinger	Comparator Standard care	Intervention Corticosteroids	Tiltro til estimaterne (at de afspejler den sande effekt i populationen)	Sammendrag
Se evidensprofil for systemisk glukokortikoid til børn og unge med behov for ilt under afsnit 4.4.1.1					

6. Implementering

Regionerne og regionernes sygehuse spiller en vigtig rolle i at understøtte implementeringen af de nationale kliniske anbefalinger gennem formidling af anbefalingernes indhold og ved at understøtte anvendelse i daglig klinisk praksis. For at understøtte anbefalingernes anvendelse lokalt, er det hensigtsmæssigt, at de nationale kliniske anbefalinger samstemmes med eller integreres i de forløbsbeskrivelser, instrukser og vejledninger, som allerede anvendes her. Regionerne bør således sikre, at de anbefalinger, som må være relevante for specialiserede afdelinger på sygehusniveau, indarbejdes i instrukser og vejledninger i den pågældende region.

De faglige selskaber er en vigtig aktør i at udbrede kendskabet til anbefalingerne. Der foreslås, at de nationale kliniske anbefalinger omtales på de relevante faglige selskabers hjemmeside, evt. med orientering om, hvad den indebærer for det pågældende speciale og med et link til den fulde version af retningslinjen. Her tænkes særligt på Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI), Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Selskab for Pædiatri (DPS). Der opfordres ligeledes til, at anbefalinger præsenteres på årsmøder i regi af de faglige selskaber og på lægedage. Information kan også formidles via medlemsblade og elektroniske nyhedsbreve.

Desuden foreslås, at anbefalingernes indhold formidles til patienter og pårørende, og at relevante patientforeninger som Danske Patienter, Forældre og Fødsel og Ældresagen spiller en rolle heri.

Implementering af de nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 er som udgangspunkt et regionalt og kommunalt ansvar. Dog ønsker Sundhedsstyrelsen at understøtte implementeringen. I foråret 2014 publicerede Sundhedsstyrelsen således en værktøjskasse med konkrete redskaber til implementering. Den er tilgængelig som et elektronisk opslagsværk på www.sst.dk. Værktøjskassen bygger på evidensen for effekten af interventioner, og den er tænkt som en hjælp til lederen eller projektlederen, der lokalt skal arbejde med implementering af forandringer af et vist omfang.

7. Monitorering

Arbejdsgruppen arbejder på, at få implementeret central monitorering af kernedata gennem en regional eller national kvalitetsdatabase og undersøge endvidere mulighederne for at monitorere anbefalingerne i de danske registre.

En regional eller national database vil muliggøre løbende monitorering af anvendelsen og udbredelsen af den nationale kliniske anbefaling (effekt- og procesindikatorer), og den vil kunne anvendes til at besvare eksisterende og kommende kliniske spørgsmål, fx. hvad angår varianter, vaccinationsstatus, prognostiske faktorer, og heterogene behandlingseffekter.

8. Opdatering og videre forskning

Opdatering

Evidensgrundlaget og anbefalingerne i disse nationale kliniske anbefalinger vil blive opdateret løbende i takt med, at der kommer ny viden på området, der medfører behov for at anbefalinger genovervejes. På samme måde kan der løbende komme flere anbefalinger med nye fokuserede spørgsmål i takt med behov og ny viden.

Videre forskning

Afsnittet vil løbende blive opdateret i takt med at nye anbefalinger tilføjes.

Arbejdsgruppen har identificeret en række forskningsprioriteter indenfor de forskellige lægemidler.

Systemisk glukokortikoid:

- Effekten af systemisk glukokortikoid hos gravide, ammende, og børn/unge med moderat og alvorlig/kritisk covid-19
- Effekten af standarddosis (lavdosis) versus højdosis systemisk glukokortikoid
- Effekten af systemisk glukokortikoid på de aktuelle virusvarianter

Baricitinib:

- Effekten af baricitinib hos børn/unge med alvorlig/kritisk covid-19
- Effekten af baricitinib versus IL-6 hæmmere (tocilizumab/sarilumab)
- Effekten af baricitinib på de aktuelle virusvarianter

Tocilizumab:

- Effekten af tocilizumab hos gravide, ammende, og børn/unge med alvorlig/kritisk covid-19
- Effekten af tocilizumab versus baricitinib
- Effekten af tocilizumab på de aktuelle virusvarianter

Sarilumab:

- Effekten af sarilumab hos gravide, ammende, og børn/unge med alvorlig/kritisk covid-19
- Effekten af sarilumab versus tocilizumab versus baricitinib
- Effekten af sarilumab på de aktuelle virusvarianter

Tromboseprofylakse:

- Effekten af terapeutisk versus profylaktisk dosis lavmolekylært heparin til voksne med alvorlig covid-19
- Effekten af terapeutisk versus profylaktisk dosis lavmolekylært heparin til gravide/ammende og børn/unge med alvorlig/kritisk covid-19
- Effekten af profylaktisk dosis lavmolekylært heparin versus ingen behandling til børn/unge med alvorlig/kritisk covid-19

Remdesivir:

- Effekten af remdesivir hos gravide, ammende, og børn/unge med mild/moderat, alvorlig, og kritisk covid-19
- Effekten af remdesivir på de aktuelle virusvarianter
- Effekten af remdesivir hos vaccinerede patienter med mild/moderat sygdom

9. Beskrivelse af anvendt metode

Den anvendte graduering af evidensens kvalitet og anbefalingsstyrke baserer sig på GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Se også: <http://www.gradeworkinggroup.org>

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en metodehåndbog for nationale kliniske anbefalinger som kan tilgås via www.sst.dk. Metodehåndbogen indeholder en beskrivelse af den metodiske tilgang og processen for udarbejdelse af evidensbasererede nationale kliniske anbefalinger.

Alle anbefalinger i disse nationale kliniske anbefalinger er udarbejdet på baggrund af evidensgrundlaget fra en eksisterende australsk retningslinje "Australian guidelines for the critical care of people with COVID-19" udarbejdet af Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Den australiske retningsline er en levende guideline. Det vil sige at evidensgrundlaget og anbefalinger og i retningslinjen opdateres løbende i takt med, at der kommer ny viden på området. Retningslinjen er udgivet elektronisk i Magicapp.org.

Den australiske retningslinje er udarbejdet efter GRADE-metoden, og har herved brugt den samme metode som Sundhedsstyrelsen anvender ved udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger.

Arbejdsgruppen bag denne NKA har formuleret og prioriteret deres egne PICO-spørgsmål, der er relevante for klinik praksis i Danmark og som kan besvares ud fra evidensgrundlaget i den australiske retningslinje. De outcome, der er valgt i den australiske retningslinje, er blevet diskuteret i forhold til relevans for danske forhold. Det er vurderet, om hvert enkelt outcome er et kritisk eller vigtigt outcome for at kunne formulere en anbefaling i en dansk kontekst.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af anbefalingerne er, at Sundhedsstyrelsen ikke selvstændigt foretager nye litteratursøgninger eller tilfører ny litteratur eller nye outcome, men i takt med at den australiske gruppe opdaterer deres evidensgrundlag, vil arbejdsgruppen opdatere anbefalingerne i denne NKA.

Anbefalingerne vil løbende blive sendt i offentlig hørring og peer review. De vil blive publiceret og opdateret løbende i takt med udarbejdelsen.

Arbejdsgruppen har for alle PICO-spørgsmål gennemgået evidensgrundlaget i den australiske retningslinje. Med udgangspunkt i evidensprofilerne har arbejdsgruppen foretaget deres egne vurderinger af resultaterne og tiltroen til estimererne. Disse vurderinger er dokumenteret i evidensprofilerne for hvert PICO-spørgsmål. Evidensgrundlaget og resultaterne er gennemgået, og der er udarbejdet selvstændige anbefalinger tilpasset danske forhold. Balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger, kvaliteten af evidensen samt patientpræferencer er blevet diskuteret. Herefter er der taget stilling til anbefalingernes retning og styrke og ordlyden af de enkelte anbefalinger samt hvilke handlingsanvisende praktiske oplysninger, der er vigtige at formidle i forhold til danske forhold. På denne måde er hele evidensgrundlaget og alle resultater blevet vurderet, og arbejdsgruppen har udarbejdet egne anbefalinger tilpasset danske forhold.

Der er foretaget en AMSTAR-vurdering af den australiske retningslinje. AMSTAR-vurderingen kan tilgås [her](#). (først ved publicering, kan for høringsversionen rekviseres ved henvendelse til SST).

10. Fokuserede spørgsmål

Fokuseret spørgsmål 1: Bør man anvende systemisk glukokortikoid til patienter med moderat og alvorlig/kritisk covid-19?

Population

Patienter med moderat sygdom og alvorlig/kritisk covid-19

- a. Voksne
- b. Gravide/ammende
- c. Børn/unge

Intervention

Systemisk glukokortikoid

Sammenligning

Ingen behandling med systemisk glukokortikoid

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Død alle årsager	Længste follow-up	Kritisk
Invasiv respiratorbehandling	Længste follow-up	Kritisk
Alvorlige bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt
Gastrointestinal blødning	Længste follow-up	Vigtigt
Hyperglykæmi	Længste follow-up	Vigtigt
neuromuskulær svækkelse	Længste follow-up	Vigtigt
neuropsykiatriske effekter	Længste follow-up	Vigtigt
Superinfektioner	Længste follow-up	Vigtigt
Udskrivelse fra hospital	Længste follow-up	Vigtigt

Udvalget af outcome kan ændre sig i takt med at nye data bliver tilgængelige. Der tages udgangspunkt i core outcome sets <https://www.comet-initiative.org/Studies/Details/1538>, samt outcome, der vurderes at være klinisk relevante for klinikere og patienter.

Fokuseret spørgsmål 2: Bør man anvende tocilizumab til patienter med alvorlig/kritisk covid-19?

Population

Patienter med alvorlig/kritisk covid-19

- a. Voksne
- b. Gravide/ammende
- c. Børn/unge

Intervention

Tocilizumab

Sammenligning

Ingen behandling med tocilizumab

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Død alle årsager	Længste follow-up	Kritisk

Invasiv respiratorbehandling	Længste follow-up	Kritisk
Respiratorisk svigt/ARDS*	Længste follow-up	Vigtigt
Alvorlige bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt
Udskrivelse fra hospital	Længste follow-up	Vigtigt
Indlæggelse på ITA	Længste follow-up	Vigtigt
Bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt
Septisk shock	Længste follow-up	Vigtigt
Rask (clinical recovery)	Længste follow-up	Vigtigt
Klinisk bedring (clinical improvement)	Længste follow-up	Vigtigt
Tid til forværring (deterioration)	Længste follow-up	Vigtigt
Varighed af respiratorbehandling	Længste follow-up	Vigtigt
Tid til bedring i tilstand	Længste follow-up	Vigtigt
Varighed af hospitalsindlæggelse	Længste follow-up	Vigtigt

Udvalget af outcome kan ændre sig i takt med at nye data bliver tilgængelige. Der tages udgangspunkt i core outcome sets <https://www.comet-initiative.org/Studies/Details/1538>, samt outcome, der vurderes at være klinisk relevante for klinikere og patienter.

*På arbejdsgruppemøde d. 9. februar 2022 blev outcomet Respiratorisk svigt/ARDS ændret fra et kritisk til et vigtigt outcome. Outcomet respiratorisk svigt/ARDS er kun målt i ét forsøg med 130 deltagere og der er lav tiltro til outcomet. Arbejdsgruppen vurderede, at outcomet er belyst ved outcomet invasiv mekanisk ventilation, hvor der er data fra over 4000 patienter og høj tiltro.

Fokuseret spørgsmål 10: Bør man anvende baricitinib til patienter med alvorlig/kritisk covid-19?

Population

Patienter med alvorlig/kritisk covid-19

- a. Voksne
- b. Gravide/ammende
- c. Børn/unge

Intervention

Baricitinib

Sammenligning

Ingen behandling med baricitinib

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Død alle årsager	Længste follow-up	Kritisk
Invasiv respiratorbehandling eller ECMO	Længste follow-up	Kritisk
Non-invasiv ventilation eller HFNO	Længste follow-up	Vigtigt
Alvorlige bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt
Varighed af indlæggelse på hospital	Længste follow-up	Vigtigt
Indlæggelse på ITA	Længste follow-up	Vigtigt
Bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt

Rask (clinical recovery)	Længste follow-up	Vigtigt
Tid til rask (recovery)	Længste follow-up	Vigtigt
Stop af intervention pga. bivirkninger	Længste follow-up	Vigtigt

Udvalget af outcome kan ændre sig i takt med at nye data bliver tilgængelige. Der tages udgangspunkt i core outcome sets <https://www.comet-initiative.org/Studies/Details/1538>, samt outcome, der vurderer at være klinisk relevante for klinikere og patienter.

Fokuseret spørgsmål 11: Bør man anvende terapeutisk dosis tromboseprofylakse til patienter med moderat/alvorlig og alvorlig/kritisk covid-19?

Population

Patienter med moderat/alvorlig og alvorlig/kritisk covid-19

- a. Voksne
- b. Gravide/ammende
- c. Børn/unge

Intervention

Terapeutisk dosis tromboseprofylakse

Sammenligning

Profylaktisk dosis tromboseprofylakse

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Død alle årsager	Længste follow-up	Kritisk
Tromemboliske events	Længste follow-up	Kritisk
Klinisk betydende blødning	Længste follow-up	kritisk
organstøttende behandling	Længste follow-up	Kritisk

Udvalget af outcome kan ændre sig i takt med at nye data bliver tilgængelige. Der tages udgangspunkt i core outcome sets <https://www.comet-initiative.org/Studies/Details/1538>, samt outcome, der vurderer at være klinisk relevante for klinikere og patienter.

En fuld liste over alle planlagte fokuserede spørgsmål kan se [her](#)

11. Arbejds- og referencegruppe

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for de nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 består af følgende personer:

- Anna Aabakke, udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
- Anita Sylvest Andersen, udpeget af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (deltager i anbefalinger vedr. tromboseprofylakse)
- Bodil Rasmussen, udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
- David Peick Sonne, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
- Isik Somuncu Johansen, udpeget af Dansk Selskab for Infektionsmedicin
- Jannik Helweg-Larsen, udpeget af Dansk Selskab for Infektionsmedicin
- Jens-Ulrik Stæhr Jensen, udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab
- Malene Plejdrup Hansen, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
- Marianne Kragh Thomsen, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
- Marie Sørensen, udpeget af Dansk Sygepleje Selskab
- Marie-Louise von Linstow, udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab
- Marianne Hoffmann, udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab (deltager i anbefalinger vedr. tromboseprofylakse)
- Michael Dalager-Pedersen, udpeget af Dansk Selskab for Infektionsmedicin
- Nanna Reiter, udpeget af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
- Jørn Dalsgaard Nielsen udpeget af Dansk Selskab for Trombose og Hæmeostase (deltager i anbefalinger vedr. tromboseprofylakse)
- Jakob Stensballe, udpeget af Dansk Selskab for Trombose og Hæmeostase (deltager i anbefalinger vedr. tromboseprofylakse)
- Yderligere udpegninger kan tilføjes ved behov

Danske Patienter blev inviteret til at udpege deltagere, men havde ikke mulighed for at stille med repræsentanter til arbejdsgruppen.

Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen

Sekretariatet for arbejdsgruppen består af følgende personer:

- Simon Tarp, formand
- Morten Hylander Møller, fagkonsulent
- Merete Storgaard, fagkonsulent (fra. 1. -6. arbejdsgruppemøde, til 1. april 2022)
- Lars Haukali Høj Ommland, fagkonsulent (fra. 7. arbejdsgruppemøde, fra 30. marts 2022)
- Jeanett Friis Rohde, metodekonsulent
- Anja Ussing, metodekonsulent
- Fie Madvig Larsen, projektleder (fra. 1. -6. arbejdsgruppemøde, til 30. marts 2022)
- Zuhreh Sarwari, projektleder (fra. 7. arbejdsgruppemøde, fra 1. april 2022)
- Kirsten Birkefoss, søgespecialist

Fagkonsulenterne har som en del af sekretariatet været overordnet ansvarlig for litteraturgennemgangen og for at udarbejde udkast til anbefalingen til drøftelse i arbejdsgruppen.

Habilitetsforhold

En person, der virker inden for det offentlige, og som har en personlig interesse i udfaldet af en konkret sag, må ikke deltage i behandlingen af denne sag. Hvis en person er inhabil, er der risiko for, at han eller hun ikke er uvildig ved vurderingen af en sag. Der foreligger habiliteterklæringer for alle arbejdsgruppemedlemmer. Habiliteterklæringerne kan tilgås [her](#)

Referencegruppen

Referencegruppen er udpeget af regioner, kommuner, patientforeninger og andre interesserter på området. Referencegruppens opgave har bestået i at kommentere på afgrænsningen af retningslinjen, de udvalgte fokuserede spørgsmål samt det faglige indhold.

Referencegruppen for de nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19 består af følgende personer:

- Anne-Mette Ørkild Mud, Amgros
- Hanne Lomholt Larsen, Lægemiddelstyrelsen
- Hanne Rolighed, Danske Regioner/ Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin
- Henrik Nielsen, Region Nordjylland
- Jan Gerstoft, Region Hovedstaden
- Janne Jensen, Region Syddanmark
- Lothar Wiese, Region Sjælland
- Sandra Husted Manata, Sundhedsministeriet
- Steen Werner Hansen, Medicinrådet

Region Midtjylland blev inviteret til at deltage, men havde ikke mulighed for at stille med en repræsentant til referencegruppen.

Peer review og høring

De nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19 har forud for udgivelsen været i høring blandt følgende høringsparter:

- *Oplistning af høringsparter der har afgivet høringssvar*

Anbefalingerne har desuden været i peer reviewet ved:

- Lars Haukali Høj Omland, afdelingslæge, ph.d, Infektionsmedicinskaafdeling, Rigshospitalet (anbefalinger om systemaisk glukokortikoid)

12. Begreber og forkortelser

Beskrivelser af udvalgte SARS-CoV-2-virusvarianter kan findes på: <https://covid19.ssi.dk/virusvarianter/virusvariantbeskrivelser>

Detaljeret beskrivelse af genom epidemiologi nationalt og globalt kan findes på: <https://nextstrain.org/ncov/open/global>

Begreb	Forklaring
Absolut effekt	Effekten af en given intervention målt i absolutte tal. Hvis risikoen for at dø af en sygdom f.eks. er 3 per 1,000 og en behandling nedsætter denne risiko til 2 per 1,000, er den absolute effekt 1 per 1,000. Den tilsvarende relative effekt er en 33% reduktion af dødeligheden, hvilket kan synes mere imponerende, men kan give et misvisende indtryk af den virkelige effekt. Derfor foretrækkes det normalt at præsentere absolute frem for relative effekter. Bemærk, at den absolute effekt vil variere med hyppigheden (prævalensen) af et givent udfald, selvom den relative effekt er konstant. Dette kan have betydning, f.eks. ved vurdering af behandlings relevans i forskellige subgrupper af patienter.
AGREE	Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation. Værktøj til kvalitetsvurdering af guidelines.
AMSTAR	A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews. Værktøj til kvalitetsvurdering af systematiske oversigtsartikler.
ARDS	(eng. acute respiratory distress syndrome), tilstand med akut indsættende diffuse inflamatoriske skader i lungerne.
Baseline risiko	Ved dikotome udfald ("enten-eller" udfald) betegner det risikoen for et givet udfald ved forsøgets begyndelse. Ved kontinuerte udfald ("udfald målt på en skala") betegner det en gennemsnitlig målt værdi ved forsøgets begyndelse. Et relateret begreb, assumed risk, findes i Summary of Findings tabellen, hvor det betegner risikoen for et givet udfald i forsøgets kontrolgruppe, eller en risiko i en kontrolgruppe hentet fra f.eks. befolkningsstatistik eller observationelle studier.
Bias	Bias er systematiske fejl i et studie, der fører til over- eller underestimering af effekten
Blinding	Blinding indebærer, at det under forsøget er ukendt hvilken gruppe en deltagerne er fordelt til. Flere parter kan være blindet, f.eks. deltageren, behandleren, den der vurderer udfald, og den der analyserer data.
95% CI	95% Konfidensinterval
Confounding	En confounder er et fænomen, som kan mudre et forskningsresultat således, at man drager ukorrekte konklusioner om sammenhænge mellem årsag og virkning.
Covid-19	Sygdom efter infektion med coronavirus SARS-CoV-2
ECMO	(eng. extra corporal membrane oxygenation), hjerte-lungemaskine.
GRADE	Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation system er et internationalt brugt systematisk og transparent system til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger. GRADE-processen starter med fokuserede spørgsmål, hvor også alle de kritiske og vigtige outcome er specifiserede. Efter at evidensen er identificeret, giver GRADE eksplisitte kriterier, hvormed man kan vurdere tiltroen til evidensen fra meget lav til høj. Kriterierne er: risiko for bias, inkonsistens, unøjagtighed, overførbarhed samt risikoen for publikations bias. Graderingen af evidensen sker i to etaper. Først graderes tiltroen til estimaterne af effekten for de enkelte outcome. Herefter graderes den samlede evidens for det fokuserede spørgsmål.
HFNO	(eng. high-flow nasal oxygen), modalitet til iltbehandling
IV	Intravenøs (medicin indsprøjtning direkte i en vene).

Hazard ratio (HR)	Betegner en ratio mellem to rater af udfald. Hvis raten af dødsfald i en interventionsgruppe for eksempel er 10 per 100, mens den er 20 per 100 i kontrolgruppen, er hazard ratio 2. Angives normalt med et sikkerhedsinterval (konfidensinterval).
Heterogenitet	Inkonsistens i mellem resultater fra forskellige studier. Måles f.eks ved I^2 , se nedenfor
I^2	Angiver den procentdel af variansen i en meta-analyse som skyldes heterogenitet. Heterogeniteten udtrykker forskelle i resultaterne i de inkluderede studier. Hvis I^2 er høj (>50%) kan det være et udtryk for de inkluderede studier viser forskellige resultater
Incident	Ny begivenhed eller hændelse. Forstås som optrædende for første gang
Intervention	Den behandling/indsats man vil komme med en anbefaling vedrørende.
ITA	Intensiv afdeling
Klinisk relevant	Et resultat er klinisk relevant, hvis størrelsen af estimatet er relevant for patienterne.
Mean Difference (MD)	Den gennemsnitlige forskel mellem to grupper.
Metaanalyse	En statistisk metode til at sammenfatte resultaterne af individuelle videnskabelige forsøg, til et overordnet estimat af størrelsen på behandlingseffekter. Behandlingseffektens samlede størrelse kan angives på forskellig måde, for eksempel som en relativ risiko, en odds ratio, eller en standardiseret, gennemsnitlig forskel mellem grupperne (SMD).
NIV	Non-invasiv ventilation (respiratorbehandling via maske)
Outcome	Udfald. Forhold, man ønsker at måle en effekt på f.eks. smerte, livskvalitet eller død. Outcome vurderes som enten kritiske eller vigtige for at kunne give en anbefaling. De kritiske outcome er styrende for anbefalingen.
PaO ₂ /FiO ₂	Forholdet mellem partialtrykket af ilt i arterielt blod og fraktionen af ilt i indåndingsluften (et mål for sværhedsgraden af lungesygdom)
PEEP	Positive end-expiratory pressure
PICO	De fokuserede spørgsmål udgør grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af litteratursøgningsstrategi, inklusions- og eksklusionskriterier, fokus ved læsning af litteratur, samt formulering af anbefalinger. De fokuserede spørgsmål specificerer patientgruppen, interventionen og effekter. Dette afspejles i akronymet PICO (Population, Intervention, Comparison and Outcomes). For yderligere beskrivelse henvises til NKR metodehåndbogen.
PIRO	PIRO Fokuserede spørgsmål omhandler diagnostiske test afspejles i akronymet PIRO (Population, Index test, Reference standard and Outcome). For yderligere beskrivelse henvises til NKR metodehåndbogen.
PO	Per oral (medicin indtages gennem munden)
Population	Målgruppen for anbefalingen.
Prospektivt cohortestudie	Et studie, som omhandler en afgrænset gruppe af personer som følges gennem et afgrænset tidsinterval
Prævalens	Andelen af en population med en bestemt tilstand
Randomiserede forsøg	Studier hvor forsøgsdeltagere fordeles tilfældigt mellem to eller flere grupper, der får forskellig (eller ingen) behandling. Den tilfældige fordeling skal sikre, at de to studiegrupper bliver så ens, at den eneste variation mellem grupperne udgøres af, hvilken behandling personerne tilbydes
RCT	(eng. randomised controlled trial), forkortelse for randomiseret forsøg
Relativ effekt	Se under Absolut effekt.
Relativ risiko (RR)	Betegner en ratio mellem to rater af udfald. Hvis raten af dødsfald i en interventionsgruppe fx er 10 pr. 100, mens den er 20 pr. 100 i kontrolgruppen, er den relative risiko 2. Angives normal med et sikkerhedsinterval.
SARS-CoV-2	Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

Sensitivitet	Andelen af de syge, der er korrekt identificerede som syge (sandt positive). Opgøres som decimaltal i intervallet 0,00 til 1,00 eller som procent i intervallet 0 til 100 %
Statistisk signifikant	Statistisk signifikans betegner, om estimatet af en behandlingseffekt er tilstrækkeligt præcist til, at man vil anse det for usandsynligt, at resultatet er fremkommet ved en tilfældighed. Oftest benytter man et konfidensinterval på 95 % omkring effektestimatet, hvilket vil sige, at det sande effektestimat vil være inkluderet i konfidensintervallet i 95 af 100 forsøg udført på samme måde. Denne grænse er valgt ud fra en konvention, ikke en naturlov, og der er derfor ikke tale om et egentligt videnskabeligt bevis for en effekt, hvis et resultat er statistisk signifikant – der er tale om en sandsynliggørelse.
Standardiseret gennemsnitlige forskel (SMD)	Kommer af standardised mean difference. For outcome, der bliver målt med forskellige skalaer i de inkluderede studier, for eksempel smerte målt på en 10 punktsskala i et studie og på en 7 punktsskala i et andet studie, er det nødvendigt at standardisere for at kunne lave en meta-analyse. Enheden bliver nu standardafvigelser i stedet for de enheder skaler oprindeligt brugte, eksempelvis point på en given skala. Som en tommelfingerregel kan resultater under 0,3 tolkes som en lille effekt, 0,3 til 0,8 som en mellem effekt og over 0,8 som en stor effekt
Specificitet	Andelen af de raske, der er korrekt identificerede som raske (sandt negative). Opgøres som decimaltal i intervallet 0,00 til 1,00 eller som procent i intervallet 0 til 100 %
Standard Deviation (SD)	Standardafvigelse
Standard Error (SE)	Standardfejl
TAU	(eng. treatment as usual), vanlig behandling

Referencer

1. Blank for Blank.
2. Systemic corticosteroids for COVID-19.
3. Angus DC, Derde L, Al-Beidh F, Annane D, Arabi Y, Beane A, et al. : Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)
4. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ, Chambers CD : A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheumatic diseases clinics of North America 2017;43(3):489-502 [Pubmed](#) [Journal](#)
5. Barros CMSS, Freire RS, Frota E, Rezende Santos AG, Farias MEL, Rodrigues MGA, et al. : Short-Course of Methylprednisolone Improves Respiratory Functional Parameters After 120 Days in Hospitalized COVID-19 Patients (Metcovid Trial): A Randomized Clinical Trial. Frontiers in medicine 2021;8 758405 [Pubmed](#) [Journal](#)
6. Corral-Gudino L, Bahamonde A, Arnaiz-Revillas F, Gómez-Barquero J, Abadía-Otero J, García-Ibarbia C, et al. : Methylprednisolone in adults hospitalized with COVID-19 pneumonia. Wiener klinische Wochenschrift 2021;133(7):303-311 [Journal](#) [Link](#)
7. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) : Antenatal corticosteroid. DSOG, 2018; [Link](#)
8. Dequin P-F, Heming N, Meziani F, Plantefève G, Voiriot G, Badié J, et al. : Effect of hydrocortisone on 21-day mortality or respiratory support among critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)
9. Du B, Weng LI : Glucocorticoid therapy for COVID-19 critically ill patients with severe acute respiratory failure. ClinicalTrials.gov 2020; [Link](#)
10. Edalatifard M, Akhtari M, Salehi M, Naderi Z, Jamshidi A, Mostafaei S, et al. : Intravenous methylprednisolone pulse as a treatment for hospitalised severe COVID-19 patients: results from a randomised controlled clinical trial. European Respiratory Journal 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)
11. Jamaati H, Hashemian SM, Farzanegan B, Malekmohammad M, Tabarsi P, Marjani M, et al. : No clinical benefit of high dose corticosteroid administration in patients with COVID-19: A preliminary report of a randomized clinical trial. European journal of pharmacology 2021;897 173947 [Journal](#) [Link](#)
12. Janusmed : Dexametason. Opdateret: 17.05.2022. Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)
13. Janusmed : Hydrokortison : Amning. Opdateret: 17.05.2022; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)
14. Janusmed : Prednisolon : Amning. Opdateret: 17.05.2022; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)
15. Jeronimo CMP, Farias MEL, Val FFA, Sampaio VS, Alexandre MAA, Melo GC, et al. : Methylprednisolone as adjunctive therapy for patients hospitalized with COVID-19 (Metcovid): a randomised, double-blind, phase IIb, placebo-controlled trial. Clinical Infectious Diseases 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)
16. Munch MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjaer M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia: the COVID STEROID randomised, placebo-controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)
17. Petersen MW, Meyhoff TS, Helleberg M, Kjær M-BN, Granholm A, Hjortsø CJS, et al. : Low-dose hydrocortisone in patients with COVID-19 and severe hypoxia (COVID STEROID) trial: protocol and statistical analysis plan. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)

18. pro.medicin.dk : Glukokortikoider. Opdateret: 26.08.2021; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

19. Ramakrishnan S, Nicolau DV, Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et al. : Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respiratory Medicine 2021; [Pubmed Journal](#)

20. RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al. : Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal Link](#)

21. Rochwerg B, Oczkowski SJ, Siemieniuk RAC, Agoritsas T, Belley-Cote E, D'Aragon F, et al. : Corticosteroids in sepsis: an updated systematic review and meta-analysis. Critical Care Medicine 2018;46(9):1411-1420 [Pubmed Journal](#)

22. Tang X, Feng Y-M, Ni J-X, Zhang J-Y, Liu L-M, Hu K, et al. : Early Use of Corticosteroid May Prolong SARS-CoV-2 Shedding in Non-Intensive Care Unit Patients with COVID-19 Pneumonia: A Multicenter, Single-Blind, Randomized Control Trial. Respiration 2021;100(2):116-126 [Journal Link](#)

23. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, Berwanger O, Rosa RG, Veiga VC, et al. : Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed Journal](#)

24. Villar J, Añón JM, Ferrando C, Aguilar G, Muñoz T, Ferreres J, et al. : Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. Trials 2020;21(1):717 [Pubmed Journal](#)

25. World Health Organization : Corticosteroids for COVID-19, Living Guidance. 2 September 2020; [Link](#)

26. Ye Z, Wang Y, Colunga-Lozano LE, Prasad M, Tangamornsuksan W, Rochwerg B, et al. : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19 based on evidence for COVID-19, other coronavirus infections, influenza, community-acquired pneumonia and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2020;192(27):E756-E767 [Pubmed Journal](#)

27. Yu L-M, Bafadhel M, Dorward J, Hayward G, Saville BR, Gbinigie O, et al. : Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. Lancet 2021;398(10303):843-855 [Pubmed Journal](#)

28. Tocilizumab for COVID-19.

29. Hermine O, Mariette X, Tharaux P-L, Resche-Rigon M, Porcher R, Ravaud P : Effect of tocilizumab vs usual care in adults hospitalized with COVID-19 and moderate or severe pneumonia: a randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine 2020; [Pubmed Journal](#)

30. Janusmed : Tocilizumab : Amning. Opdateret: 17.05.2022; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

31. Janusmed : Tocilizumab : Fosterpåverkan. Opdateret: 03.05.2022; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

32. Mallalieu NL, Wimalasundera S, Hsu JC, Douglass W, Wells C, Penades IC, et al. : Intravenous dosing of tocilizumab in patients younger than two years of age with systemic juvenile idiopathic arthritis: results from an open-label phase 1 clinical trial. Pediatric rheumatology online journal 2019;17(1):57 [Pubmed Journal](#)

33. Mariette X, Hermine O, Tharaux P-L, Resche-Rigon M, Steg PG, Porcher R, et al. : Effectiveness of Tocilizumab in Patients Hospitalized With COVID-19: A Follow-up of the CORIMUNO-TOCI-1 Randomized Clinical Trial. JAMA internal medicine 2021;181(9):1241-1243 [Pubmed Journal](#)

34. Pro.medicin.dk : RoActemra. Opdateret: 23.12.2021; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

35. RECOVERY Collaborative Group : Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. Lancet 2021;397(10285):1637-1645 [Pubmed Journal](#)

36. REMAP-CAP Investigators, Gordon AC, Mouncey PR, Al-Beidh F, Rowan KM, Nichol AD, et al. : Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)

37. Rosas IO, Diaz G, Gottlieb RL, Lobo SM, Robinson P, Hunter BD, et al. : Tocilizumab and remdesivir in hospitalized patients with severe COVID-19 pneumonia: a randomized clinical trial. Intensive Care Medicine 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)

38. Rosas IO, Bräu N, Waters M, Go RC, Hunter BD, Bhagani S, et al. : Tocilizumab in hospitalized patients with severe Covid-19 pneumonia. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)

39. Salama C, Han J, Yau L, Reiss WG, Kramer B, Neidhart JD, et al. : Tocilizumab in patients hospitalized with Covid-19 pneumonia. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)

40. Salvarani C, Dolci G, Massari M, Merlo DF, Cavuto S, Savoldi L, et al. : Effect of tocilizumab vs standard care on clinical worsening in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia: a randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)

41. Soin AS, Kumar K, Choudhary NS, Sharma P, Mehta Y, Kataria S, et al. : Tocilizumab plus standard care versus standard care in patients in India with moderate to severe COVID-19-associated cytokine release syndrome (COVINTOC): an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Respiratory Medicine 2021;9(5):511-521 [Pubmed](#) [Journal](#)

42. Stone JH, Frigault MJ, Serling-Boyd NJ, Fernandes AD, Harvey L, Foulkes AS, et al. : Efficacy of tocilizumab in patients hospitalized with Covid-19. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)

43. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information: Actemra (tocilizumab). March 2020; [Link](#)

44. US Food and Drug Administration : Emergency use authorization (EUA) of remdesivir (GS-5734). 2020; [Link](#)

45. Veiga VC, Prats JAGG, Farias DLC, Rosa RG, Dourado LK, Zampieri FG, et al. : Effect of tocilizumab on clinical outcomes at 15 days in patients with severe or critical coronavirus disease 2019: randomised controlled trial. BMJ 2021;372 n84 [Pubmed](#) [Journal](#)

46. Wang D, Fu B, Peng Z, Yang D, Han M, Li M, et al. : Tocilizumab in patients with moderate or severe COVID-19: a randomized, controlled, open-label, multicenter trial. Frontiers of Medicine 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)

47. Remdesivir dosage for COVID-19.

48. Goldman JD, Lye DC, Hui DS, Marks KM, Bruno R, Montejano R, et al. : Remdesivir for 5 or 10 days in patients with severe Covid-19. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed](#) [Journal](#) [Link](#)

49. Spinner CD, Gottlieb RL, Criner GJ, Arribas López JR, Cattelan AM, Soriano Viladomiu A, et al. : Effect of Remdesivir vs standard care on clinical status at 11 days in patients with moderate COVID-19: a randomized clinical trial. JAMA 2020; [Pubmed](#) [Journal](#)

50. Pan H, Peto R, Karim AQ, on behalf of the WHO Solidarity trial consortium : Repurposed antiviral drugs for COVID-19 - interim WHO SOLIDARITY trial results. medRxiv 2020; [Journal](#) [Link](#)

51. Goldman DL, Aldrich ML, Hagmann SHF, Bamford A, Camacho-Gonzalez A, Lapadula G, et al. : Compassionate use of remdesivir in children with severe COVID-19. Pediatrics 2021;147(5); [Pubmed](#) [Journal](#)

52. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, Mehta AK, Zingman BS : Remdesivir for the treatment of Covid-19 - final report. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed](#) [Journal](#) [Link](#)

53. Ader F, Bouscambert-Duchamp M, Hites M, Peiffer-Smadja N, Poissy J, Belhadi D, et al. : Remdesivir plus standard of care versus standard of care alone for the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19 (DisCoVeRy): a phase 3, randomised, controlled, open-label trial. Lancet Infectious Diseases 2021; [Pubmed](#) [Journal](#)

54. Burwick RM, Yawetz S, Stephenson KE, Collier A-RY, Sen P, Blackburn BG, et al. : Compassionate use of remdesivir in pregnant

women with severe Covid-19. Clinical Infectious Diseases 2020; [Pubmed Journal](#)

55. Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, et al. : Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2020; [Pubmed Journal Link](#)

56. WHO Solidarity Trial Consortium, Pan H, Peto R, Henao-Restrepo A-M, Preziosi M-P, Sathiyamoorthy V, et al. : Repurposed antiviral drugs for Covid-19 - interim WHO Solidarity Trial results. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed Journal](#)

57. Remdesivir for COVID-19. 2020;

58. Mahajan L, Singh AP, Gifty : Clinical outcomes of using remdesivir in patients with moderate to severe COVID-19: A prospective randomised study. Indian Journal of Anaesthesia 2021;65(Suppl 1):S41-S46 [Pubmed Journal](#)

59. Sivapalasingam S, Lederer D, Bhore R : A randomized placebo-controlled trial of sarilumab in hospitalized patients with COVID-19. medRxiv 2021; [Journal Link](#)

60. Lescure F-X, Honda H, Fowler RA, Lazar JS, Shi G, Wung P, et al. : Sarilumab in patients admitted to hospital with severe or critical COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respiratory Medicine 2021; [Pubmed Journal](#)

61. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information: Kevzara (Sarilumab) pre-filled pen and pre-filled syringe. 2018; [Link](#)

62. Australian Public Assessment Report for Sarilumab. Australian Government Department of Health - Therapeutic Goods Administration 2018; [Link](#)

63. Sarilumab for COVID-19.

64. Shankar-Hari M : Association Between Administration of IL-6 Antagonists and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Meta-analysis. 2021; [Journal](#)

65. [Baricitinib] for [COVID-19].

66. Costanzo G, Firini D, Losa F, Deidda M, Barca MP, Del Giacco S : Baricitinib exposure during pregnancy in rheumatoid arthritis. Therapeutic advances in musculoskeletal disease 2020;12 1759720X19899296 [Pubmed Journal](#)

67. Ely W, Ramanan A, Kartman C : Baricitinib plus Standard of Care for Hospitalised Adults with COVID-19 on Invasive Mechanical Ventilation or Extracorporeal Membrane Oxygenation: Results of a Randomised, Placebo-Controlled Trial. medRxiv 12 October 2021; [Journal Link](#)

68. Gerosa M, Argolini LM, Artusi C, Chighizola CB : The use of biologics and small molecules in pregnant patients with rheumatic diseases. Expert Review of Clinical Pharmacology 2018;11(10):987-998 [Pubmed Journal](#)

69. Janusmed : Baricitinib : Fosterpåverkan. Opdateret: 02.03.2018; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

70. Kalil AC, Patterson TF, Mehta AK, Tomashek KM, Wolfe CR, Ghazaryan V, et al. : Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. New England Journal of Medicine 2020; [Pubmed Journal](#)

71. Marconi VC, Ramanan AV, de Bono S, Kartman CE, Krishnan V, Liao R, et al. : Efficacy and safety of baricitinib for the treatment of hospitalised adults with COVID-19 (COV-BARRIER): a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet Respiratory Medicine 2021; [Pubmed Journal](#)

72. Pro.medicin.dk : Olumiant. Opdateret: 26.11.2021; Senest hentet: 08.06.2022 [Link](#)

73. RECOVERY Collaborative Group : Baricitinib in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial and updated meta-analysis. Medrxiv 2022 ; March 3 [Journal Link](#)

74. Summary of Product Characteristics - Olumiant. [Link](#)

75. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information - Olumiant (baricitinib). 23 April 2021; [Link](#)

76. Perepu US, Chambers I, Wahab A, Ten Eyck P, Wu C, Dayal S, et al. : Standard prophylactic versus intermediate dose enoxaparin in adults with severe COVID-19: A multi-center, open-label, randomized controlled trial. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2021;n/a(n/a); [Journal Link](#)

77. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information: DBL heparin sodium injection BP (heparin sodium). 2018; [Link](#)

78. Bikdeli B, Talasaz AH, Rashidi F, Bakhshandeh H, Rafiee F, Matin S, et al. : Intermediate vs standard-dose prophylactic anticoagulation in patients with COVID-19 admitted to ICU: ninety-day results from the INSPIRATION Trial. Thrombosis and Haemostasis 2021; [Pubmed Journal](#)

79. Flumignan RLG, Tinôco JD, Pascoal PIF, Areias LL, Cossi MS, Fernandes MICD, et al. : Prophylactic anticoagulants for people hospitalised with COVID-19. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020; [Journal](#)

80. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information: Fragmin injection (dalteparin sodium). 2020; [Link](#)

81. REMAP-CAP Investigators, ACTIV-4a Investigators, ATTACC Investigators : Therapeutic anticoagulation with heparin in critically ill patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal Link](#)

82. INSPIRATION Investigators, Sadeghipour P, Talasaz AH, Rashidi F, Sharif-Kashani B, Beigmohammadi MT, et al. : Effect of intermediate-dose vs standard-dose prophylactic anticoagulation on thrombotic events, extracorporeal membrane oxygenation treatment, or mortality among patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit: the INSPIRATION randomized clinical trial. JAMA 2021; [Pubmed Journal](#)

83. Therapeutic Goods Administration : Australian Product Information - Clexane and Clexane Forte (exoxaparin sodium). 2020; [Link](#)

84. Lemos ACB, do Espírito Santo DA, Salvetti MC, Gilio RN, Agra LB, Pazin-Filho A, et al. : Therapeutic versus prophylactic anticoagulation for severe COVID-19: A randomized phase II clinical trial (HESACOVID). Thrombosis Research 2020;196 359-366 [Pubmed Journal](#)

85. Australian Medicines Handbook 2020 (online). 2020; [Link](#)

86. Sholzberg M, Tang GH, Rahhal H, AlHamzah M, Kreuziger LB, Ní Áinle F, et al. : Heparin for Moderately Ill Patients with Covid-19. medRxiv 2021/01/01; 2021.07.08.21259351 [Journal Link](#)

87. Sholzberg M, Tang GH, Rahhal H, AlHamzah M, Kreuziger LB, Áinle FN, et al. : Effectiveness of therapeutic heparin versus prophylactic heparin on death, mechanical ventilation, or intensive care unit admission in moderately ill patients with covid-19 admitted to hospital: RAPID randomised clinical trial. BMJ 2021;375 n2400 [Pubmed Journal](#)

88. ATTACC Investigators, ACTIV-4a Investigators, REMAP-CAP Investigators : Therapeutic anticoagulation with heparin in noncritically ill patients with Covid-19. New England Journal of Medicine 2021; [Pubmed Journal Link](#)

89. Lopes RD, de Barros e Silva PGM, Furtado RHM, Macedo AVS, Bronhara B, Damiani LP, et al. : Therapeutic versus prophylactic anticoagulation for patients admitted to hospital with COVID-19 and elevated D-dimer concentration (ACTION): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. The Lancet 2021;397(10291):2253-63 [Pubmed Journal Link](#)

90. Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce : Australian guidelines for the clinical care of people with COVID-19 : Living Guidelines. Opdateres løbende. Senest hentet: 16.03.2022 [Link](#)

91. Norwegian MAGIC Evidence Ecosystem Foundation : MagicApp (MAGIC authoring and publication platform). [Link](#)

92. Sarilumab for COVID-19.

93. Gupta A., Gonzalez-Rojas Y., Juarez E., Crespo Casal M., Moya J., Rodrigues Falci D., et al. : Effect of Sotrovimab on Hospitalization or Death Among High-risk Patients With Mild to Moderate COVID-19: A Randomized Clinical Trial. *Jama* 2022;327(13):1236-1246 [Journal](#)

94. RECOVERY Collaborative Group : Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. *Lancet* (London, England) 2022;399(10325):665-676 [Journal](#)

95. WHO Solidarity Trial Consortium : Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses. *The Lancet* 2022;May 02 [Journal](#) [Link](#)

96. [Intervention] for [COVID-19].

97. Kreuzberger N., Hirsch C., Chai KL, Tomlinson E., Khosravi Z., Popp M., et al. : SARS-CoV-2-neutralising monoclonal antibodies for treatment of COVID-19. *The Cochrane database of systematic reviews* 2021;9(9):CD013825 [Journal](#)

98. O'Brien MP, Forleo-Neto E., Sarkar N., Isa F., Hou P., Chan KC, et al. : Effect of Subcutaneous Casirivimab and Imdevimab Antibody Combination vs Placebo on Development of Symptomatic COVID-19 in Early Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection: A Randomized Clinical Trial. *Jama* 2022;327(5):432-441 [Journal](#)

99. RECOVERY Collaborative Group : Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. *Lancet* (London, England) 2022;399(10325):665-676 [Journal](#)

100. Somersan-Karakaya S, Mylonakis E, Menon VP, Wells JC, Ali S, Sivapalasingam S, et al. : REGEN-COV® for Treatment of Hospitalized Patients with Covid-19. *medRxiv* 2021; 2021.11.05.21265656 [Journal](#) [Link](#)

101. Weinreich DM, Sivapalasingam S., Norton T., Ali S., Gao H., Bhore R., et al. : REGN-COV2, a Neutralizing Antibody Cocktail, in Outpatients with Covid-19. *The New England journal of medicine* 2021;384(3):238-251 [Journal](#)

102. Weinreich DM, Sivapalasingam S., Norton T., Ali S., Gao H., Bhore R., et al. : REGN-COV Antibody Combination and Outcomes in Outpatients with Covid-19. *The New England journal of medicine* 2021;385(23):e81 [Journal](#)

103. Evusheld for COVID-19 prophylaxis.

104. [REGN-COV2] for [COVID-19].